

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ПЕРЕКИС ВОДНЮ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* водню пероксид;

100 мл розчину містять водню пероксиду 30 % 10 г;

*допоміжні речовини:* натрію бензоат (Е 211), вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора безбарвна рідина.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X01.

При контакті препарату з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільняється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні перекису водню відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

**Показання для застосування.**

Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Застосування перекису водню на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту. Препарат слід з обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порожнин, враховуючи можливість емболій.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також в освітленому і теплом місці. Слід уникати потрапляння перекису водню в очі.

*Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.*

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Застосовують.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими***

**механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Перекис водню наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином перекису водню. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

**Термін придатності.**

2 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 мл або 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.