

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УРОЛЕСАН®
(UROLESAN)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл сиропу містить ялиці олії - 4,19 мг, м'яті перцевої олії - 1,05 мг, моркви дикої плодів екстракту рідкого (1:1) - 12,04 мг, хмелю шишок екстракту рідкого (1:1) - 17,26 мг, материнки трави екстракту рідкого (1:1) - 11,95 мг;

допоміжні речовини: полісорбат-80; кислота лимонна, моногідрат; кислота сорбінова; сироп цукровий; динатрію едетат; вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Рідина світло-жовтого кольору із зеленуватим відтінком, із специфічним запахом. Допускається опалесценція.

Назва та місцезнаходження виробника. АТ «Галичфарм», Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовуються в урології. Код АТХ G04B X.

Комбінований препарат рослинного походження. Складові препарату Уролесан® зменшують запальні явища в сечовивідних шляхах та нирках, сприяють посиленому кровообігу нирок та печінки, мають діуретичну, антибактеріальну, жовчогінну дію, утворюють захисний колоїд у сечі та нормалізують тонус гладкої мускулатури верхніх сечовивідних шляхів та жовчного міхура.

Уролесан® збільшує виділення сечовини та хлоридів, сприяє виведенню дрібних конкрементів та піску із сечового міхура і нирок.

Препарат добре всмоктується, дія його починається через 20-30 хвилин і триває 4-5 год. Максимальний ефект настає через 1-2 год. Виводиться через травний тракт та нирками.

Показання для застосування. Гострі та хронічні інфекції сечовивідних шляхів та нирок (цистити та пієлонефрити); сечокам'яна хвороба та сечокислий діатез (профілактика утворення конкрементів після їх видалення); хронічні холецистити (в тому числі калькульозні), дискінезії жовчних шляхів, жовчокам'яна хвороба.

Протипоказання.

- Підвищена чутливість до компонентів препарату;
- гастрити, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не застосовувати препарат у випадку, коли діаметр конкрементів перевищує 3 мм.

Пацієнтам з цукровим діабетом, а також пацієнтам з підвищеним вмістом глюкози у крові необхідно бути обережними, застосовуючи Уролесан® (до складу препарату входить цукровий сироп).

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату у період вагітності або лактації не вивчалось.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Немає повідомлень.

Діти. Препарат не застосовується у дитячому віці до 1 року.

Спосіб застосування та дози. Препарат приймають внутрішньо перед їжею.

Рекомендовані дози для дорослих: по 1 чайній ложці (5 мл) сиропу 3 рази на добу. При гострих станах (в т.ч. при нирковій та печінковій коліках) тривалість курсу терапії становить від 5 до 7 днів, при хронічних станах – від 7 днів до 1 місяця. При виникненні ниркової та печінкової кольок разову дозу можна одноразово підвищити до 2-х чайних ложок (10 мл), після цього на наступний прийом повернутись до звичайної разової дози (5 мл).

Рекомендовані дози для дітей: 1-2 роки – по 1-2 мл 3 рази на добу; 2-7 років – по 2-4 мл 3 рази на добу; 7-14 років – по 4-5 мл 3 рази на добу. Дозування проводиться за допомогою шприца-дозатора.

Передозування. При передозуванні можливі: нудота, запаморочення.

Лікування: інтенсивне тепле пиття, спокій, активоване вугілля, атропіну сульфат (0,0005-0,001 г).

Побічні ефекти. Зазвичай Уролесан® добре переноситься. При застосуванні препарату можливі:

- з боку травного тракту: диспепсичні явища (нудота, блювання);
- алергічні реакції: відчуття свербежу, почервоніння обличчя, шкірні висипання, ангіоневротичний набряк (відчуття першіння у горлі, затруднення дихання, набряк обличчя, язика);
- з боку центральної та периферичної нервової системи: запаморочення, загальна слабкість;
- з боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія, гіпертензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не вивчалась.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Після відкриття зберігати не більше 28 діб при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 90 мл у банці або флаконі; по 180 мл у флаконі, які вкладені у пачку разом з шприцом-дозатором.

Категорія відпуску. Без рецепта.