

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
(PERSEN® FORTE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: капсули коричневого кольору;

склад: 1 капсула містить 125 мг екстракту валеріани (Extr. Valerianae radix), 25 мг екстракту меліси (Extr. Melissaе) та 25 мг екстракту м'яти перцевої (Extr. Menthae piperitae);

допоміжні речовини: магнію оксид, лактози моногідрат, тальк, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний.

Форма випуску. Капсули.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні препарати. Код АТС N05СМ09.

Фармакологічні властивості. Персен® форте є препаратом рослинного походження з м'якою седативною дією.

Валеріана має седативну дію. Вона виявляє позитивний вплив при симптомах дратівливості, таких як неспокій, збудження і напруження внаслідок нервового перевантаження. При безсонні сприяє скорішому засинанню.

Меліса також має седативну та спазмолітичну дію.

М'ята перцева традиційно застосовується у поєднанні з валеріаною у заспокійливих препаратах.

Персен® форте застосовують при неврозах, коли прийом сильнодіючих заспокійливих засобів недоцільний.

Показання для застосування. Персен® форте призначають при неврозах, що супроводжуються такими симптомами:

- нервові збудження;
- неспокій;
- зниження концентрації уваги;
- розлади сну.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі і діти від 12 років: при нервозності 1 – 2 капсули 2 – 3 рази на добу.

При безсонні 1 – 2 капсули за годину до сну.

Термін лікування необмежений. Навіть при тривалому застосуванні капсул звикання не спостерігається.

Після припинення лікування абстинентного синдрому не відмічалось.

Побічна дія. Можливі реакції підвищеної чутливості.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не призначають дітям до 12 років.

Передозування. Токсичної дії препарату не відмічено. Одноразовий прийом приблизно 25 капсул може спричинити появу таких симптомів, як втомленість, спазм у черевній порожнині, неспокій, запаморочення, тремор рук і розширення зіниць. Ці симптоми зникають протягом 24 годин.

Особливості застосування.

Застосування в періоди вагітності та лактації. Негативної дії ліків не відмічено. Як і у випадку застосування ліків взагалі, особливої обережності слід дотримуватись у першому триместрі вагітності та під час грудного вигодовування, тому рішення про застосування препарату повинен прийняти лікар.

Вплив на психофізичну здатність. У рекомендованих дозах препарат не впливає на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. **Не відома.**

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому місці.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Термін придатності - 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 2 блістери по 10 капсул у картонній упаковці.

Виробник. Лек фармацевтична компанія д.д.

Адреса. Веровшкова 57, Любляна, Словенія.