

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### РЕВМАФІТ

#### Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* 1 капсула містить сухий водний екстракт мартинії запашної (1,5-2,5:1) – 250 мг;

*допоміжні речовини:* лактоза, моногідрат, магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, желатин, титану діоксид (E 171), вода очищена.

**Лікарська форма.** Капсули тверді.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

Фітофарм Кленка С.А., Польща.

Кленка 1, 63-040 Нове Место над Вартою, Польща.

#### Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при патології опорно-рухового апарату.

Код АТС M09A X10\*.

Корінь мартинії запашної (*Harpagophytum procumbens*) є основою протизапальних, знеболювальних препаратів, які застосовуються для лікування дегенеративних змін рухового апарату.

Екстракт із кореня мартинії запашної містить іридоїдні глікозиди, в тому числі, гарпагозид, гарпагід і прокумбін, які зумовлюють протизапальну та слабку знеболювальну дію. Застосування екстракту призводить до зменшення больового дискомфорту при дегенеративних захворюваннях суглобів. Гіркі речовини, які містяться у препараті стимулюють виділення шлункового соку і жовчі.

#### Показання для застосування.

Дегенеративні захворювання суглобів, запалення сухожиль.

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки. Дитячий вік до 18 років.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

У випадку жовчокам'яної хвороби препарат застосовують з особливою обережністю і тільки за призначенням та під контролем лікаря.

Оскільки препарат Ревмафіт містить лактозу, його не рекомендується призначати пацієнтам зі спадковими станами, що супроводжуються непереносимістю галактози, мальабсорбцією глюкози-галактози та недостатністю лактази.

#### Особливі застереження.

Увага! Препарат підсилює апетит.

#### Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не встановлена безпека та ефективність застосування Ревмафіту в період вагітності та годування груддю, тому не рекомендується призначати препарат хворим цієї категорії.

#### Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат призначають внутрішньо, після їди, дорослим по 1 - 3 капсули 2 рази на добу. У випадку дегенеративних захворювань суглобів, що супроводжуються болем, препарат слід застосовувати не менше 2 - 3 місяців.

Якщо симптоми захворювання зберігаються, необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого лікування.

**Передозування.**

Випадків передозування не відмічалось.

**Побічні ефекти.**

У поодиноких випадках разом із підвищеною чутливістю може виникнути слабко виражені симптоми з боку травного тракту (нудота, блювання, діарея), підвищене потовиділення, особливо при застосуванні у високих дозах.

В осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

*У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій хворому слід обов'язково порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.*

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 65 капсул у флаконі, упакованому в картонну коробку.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.