

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ
(VALIDOL-DARNITSA)

Загальна характеристика:

хімічна назва: 5-метил-2-(2-пропіл)циклогексанол та

[5-метил-2-(2-пропіл)циклогексил]-3-метилбутаноат;

основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, з плоскою поверхнею, рискою та фаскою, з характерним запахом ментолу. На поверхні таблеток допускаються сіруваті вкраплення та порошкоподібний наліт;

склад: 1 таблетка містить 0,06 г валідолу або розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової;

допоміжні речовини: цукор-пісок або цукор-рафінад, кальцію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Різні комбіновані кардіологічні препарати.

Код АТС С01Е Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Валідол – складна речовина, що утворюється при розчиненні ментолу у ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. При сублінгвальному прийомі дія препарату обумовлена ефектами ментолу та ефіру ізовалеріанової кислоти. Перший – подразнюючи чутливі нервові закінчення на слизовій оболонці ротової порожнини, викликає рефлекторну судинорозширюючу дію. Другий – стимулює у центральній нервовій системі утворення та вивільнення енкефалінів, ендорфінів, динорфінів і пептидів, що регулюють відчуття болю. В цілому розвивається покращання регіонального кровообігу, зменшує вираженість больових відчуттів. Препарат діє заспокійливо.

Фармакокінетика. Препарат швидко всмоктується у ротовій порожнині і вже через декілька хвилин досягає максимуму концентрації у системному кровотоці. Частково трансформується у печінці. Продукти трансформації виділяються з організму через кишечник з жовчю. Препарат у незміненому вигляді виділяється з організму із сечею та видихуваним повітрям.

Показання для застосування. Функціональні кардіалгії ангіоневротичного характеру, неврози, істерія, морська та повітряна хвороба.

Спосіб застосування та дози. Валідол-Дарниця розсмоктують під язиком до повного розчинення, по 1-2 таблетки.

Добова кратність і тривалість прийому препарату визначаються залежно від ефективності лікування і в середньому становить 2-4 таблетки на добу.

Побічна дія. При тривалому застосуванні Валідолу-Дарниця зрідка можуть спостерігатися легка нудота, слезотеча, запаморочення, які швидко минають самостійно.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена артеріальна гіпотензія, дитячий вік до 2 років.

Передозування. Малоймовірно, в зв'язку з низькою токсичністю компонентів препарату, але при навмисному прийомі препарату у великій кількості можливий розвиток гіперчутливості.

Лікування. Промивання шлунка, прийом десенсibiliзуючих засобів.

Особливості застосування. У випадках, коли біль у ділянці серця не минає після прийому препарату, необхідно виключити гострий коронарний синдром.

З обережністю препарат застосовують для лікування вагітних і жінок, що годують груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Валідол-Дарниця полегшує головний біль, спричинений застосуванням нітратів, підсилює дію седативних засобів.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі від 8 °С до 15 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 6 або 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці.

Виробник. ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Адреса. Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.