

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування препарату  
**НУКС ВОМІКА-ГОМАКОРД**  
**(NUX VOMICA-HOMACCORD®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: Strychnos nux-vomica D2 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D10 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D30 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D1000 – 0,2 г, Bryonia D2 – 0,2 г, Bryonia D6 – 0,2 г, Bryonia D10 – 0,2 г, Bryonia D15 – 0,2 г, Bryonia D30 – 0,2 г, Bryonia D200 – 0,2 г, Bryonia D1000 – 0,2 г, Lycopodium clavatum D3 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D30 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D3 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 – 0,3 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекеверг-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного походження, які входять до складу препарату.

**Показання для застосування.**

Функціональні порушення та запалення з боку шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та печінки, спастичний запор, хронічний гепатит, інтоксикаційне ураження печінки та токсикоз вагітних, синдром абстиненції (алкогольний, наркотичний), виразковий коліт, дивертикуліт, гастрит і дуоденіт (гострий та хронічний), виразка шлунка, дисбіоз кишечника, метеоризм.

**Протипоказання.**

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Питання про доцільність і тривалість застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Невідома.

*Діти.*

Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим та дітям від 6 років – по 10 крапель, дітям до 2 років – по 3 краплі, від 2 до 6 років – по 5 крапель 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити в 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

У гострих випадках приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших двох годин.

Курс лікування – 2-5 тижнів.

Лікар може зменшити частоту прийому до 1-2 разів на добу та призначити повторний курс лікування через 2-3 тижні.

**Передозування.**

Не відзначалось.

**Побічні ефекти.**

У поодиноких випадках гомеопатичне початкове загострення може призвести до тимчасового запаморочення та головного болю, що швидко проходить і не потребує відміни препарату. У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.