

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ПЕРМЕТРИНОВА МАЗЬ 4%**  
**(PERMETHRIN OINTMENT 4%)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить 40 мг перметрину;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, карбомер 940, триетаноламін, вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

Гелеподібна непрозора маса від білого до кремового кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ТОВ «ЛІМП», вул.Вієталвас 1, Рига, LV-1009, Латвія.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи коростяних кліщів.  
Код АТС R03A C04.

*Фармакологічні властивості.*

Перметрин є сумішшю цис- і трансізомерів синтетичного пиретроїду. Це інсектицидний та акарицидний засіб для зовнішнього застосування, що діє на багатьох комах, у тому числі і на коростяного кліща. Пригнічує розвиток і спричиняє загибель личинок та статевозрілих особин. Протипаразитарна дія зумовлена порушенням іонної проникності через натрієві канали, гальмуванням процесів поляризації (реполяризації) мембрани нервової клітини комах, що зумовлює паралізуючий ефект. Перметрин малотоксичний для людини і теплокровних тварин.

Після наскірної аплікації абсорбція становить не більше 2%. Частина речовини, яка потрапила до системного кровотоку, швидко гідролізується до неактивних метаболітів, екскретується переважно з сечею. Як протикоростяний засіб ефективний після одноразової процедури.

**Показання для застосування.** Короста, демодекоз.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до активної речовини, інших піретроїдів чи піретринів або до будь-якої допоміжної речовини, гострі запальні захворювання шкіри волосистої частини голови. Період годування груддю. Дитячий вік до 2 місяців.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Перметринова мазь 4 % призначена тільки для зовнішнього застосування.

Необхідно уникати попадання мазі на кон'юнктиву очей. Якщо це трапилось, слизові оболонки слід промити великою кількістю проточної води. Персоналові, який проводить обробки препаратом, необхідно захищати руки гумовими рукавичками. Після процедури ретельно вимити руки з милом.

Для лікування дітей препарат застосовують лише за призначенням лікаря.

При свербіжі, який не зникає протягом 4 тижнів після лікування корости, хворому необхідно проконсультуватися у лікаря.

Для уникнення повторного зараження коростою необхідно обробити (термічно) одяг, головні убори, постільну білизну.

При наявності шкірних захворювань, при порушенні цілісності шкіри, запальних процесах та вторинних інфекціях шкіри, а також при застосуванні інших ліків слід проконсультуватися у лікаря.

**Особливі застереження.**

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

- **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Обмежені дані щодо використання перметинової мазі під час вагітності, після нашкірної аплікації абсорбція становить не більше 2 %. Препарат не рекомендовано застосовувати під час вагітності, за винятком тих випадків, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода і дитини. У період годування груддю слід припинити годування груддю.

- **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Немає повідомлень про вплив препарату на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

- **Діти.** Протипоказано застосовувати у дітей до 2 місяців. Дітям віком 2 місяці та старше препарат застосовують за призначенням лікаря.

### **Спосіб застосування та дози.**

Невелику кількість мазі тонким шаром наносять на уражені коростою або демодекозом ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирають у шкіру. Через 24 години після процедури мазь необхідно змити водою з милом і змінити одяг. Як правило, процедуру проводять одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з'являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку слід повторити.

При лікуванні демодекозу мазь застосовують 1-2 рази на день, протягом 10-14 днів.

### **Передозування.**

Інформації про випадки передозування немає.

У випадку передозування можливе посилення симптомів, зазначених у розділі "Побічні ефекти".

При передозуванні припинити застосування препарату, промити шкіру великою кількістю теплої води. Можливе застосування антигістамінних засобів.

**Побічні ефекти.** В окремих випадках можлива подразнювальна дія на шкіру, відчуття печіння, поколювання або пощипування, посилення свербіжу, набряклість, оніміння шкіри, парестезія, біль, еритема, екзема, алергічні реакції (шкірні висипи, набряк). У таких випадках застосування мазі припиняють. У пацієнтів з коростою свербіж може тривати протягом 4 тижнів після закінчення лікування. Це може бути зумовлено наявністю алергічної реакції на змертвілі залишки коростяного кліща під шкірою та не вказує на неефективність лікування.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.**

Перед нанесенням перметринової мазі слід припинити застосування кортикостероїдів, які застосовують для лікування екзематозноподібних реакцій, оскільки існує ризик загострення проявів корости внаслідок зниження функції імунної системи. Існує ймовірність, що дана взаємодія призведе до посилення побічних реакцій чи зниження ефективності обох препаратів.

**Термін придатності** – 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 С°.

**Упаковка.** По 45 г у полімерних пеналах або по 40 г у алюмінієвих тубах; по 1 пеналу або 1 тубі в картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.