

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЛАНТЕКС®
(PLANTEKX®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: світло-коричневі мармурові дрібні гранули;

склад: 1 пакетик (5 г) містить екстракту фенхелю 250 мг; фенхельного ароматизатора з мінімальним вмістом 0,5 мг анетолу і 0,2 мг фенхону;

допоміжні речовини: глюкоза безводна, лактози моногідрат.

Форма випуску. Гранули розчинні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту. Код АТС А03А Х20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Активні речовини, що входять до складу препарату, стимулюють процес травлення, зменшують газоутворення у кишечнику, поліпшують відходження газів, пом'якшують спазми кишечника.

Фармакокінетика. Препарат рослинного походження. Фармакокінетика не вивчалась.

Показання для застосування. Усунення розладів травного дискомфорту, таких як спазми кишечника, накопичення газів і метеоризм у дітей.

Застосовується для профілактики метеоризму у дітей.

Спосіб застосування та дози.

Немовлятам від 2 тижнів до 1 року: по 1 - 2 пакетики на добу.

Висипати вміст одного пакетика у пляшечку для годування, додати 100 мл теплої свіжоперевареної води і добре струсити, щоб гранули розчинились. Давати рідину немовляті після годування.

Діти від 1 до 4 років: по 2 - 3 пакетики на добу. Висипати вміст одного пакетика у чашку і додати 100 мл теплої свіжоперевареної води чи молока. Перемішати рідину до розчинення і давати дитині після або між годуваннями.

У дозах, що рекомендуються, ПЛАНТЕКС® може застосовуватись необмежений час.

Побічна дія. Не виявлена.

Протипоказання. Відома гіперчутливість до компонентів препарату.

Передозування. Симптоми передозування не виявлені.

Особливості застосування. Дітям слід давати тільки свіжоприготовлену теплу рідину. Не підсолоджувати. ПЛАНТЕКС® рекомендується також приймати жінкам, які годують груддю: по 3 - 4 пакетики на добу.

Через те що ПЛАНТЕКС® містить глюкозу і лактозу, не рекомендується застосовувати більше 2 пакетиків на добу дітям з лактазною недостатністю, з галактоземією або синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози (зниження всмоктування галактози чи глюкози у слизовій оболонці тонкого кишечника). Один пакетик містить 4,7 г карбогідратів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами дотепер не відмічалось.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25⁰ С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності - 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 5 г гранул у набірному пакету № 1; по 10 або 50 пакетиків у картонній коробці.

Виробник. Лек фармацевтична компанія д.д.

Адреса. Веровшкова 57, Любляна, Словенія.