

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛЕРІАНИ НАСТОЙКА
(VALERIANAE TINCTURA)

Склад лікарського засобу: 1 флакон містить діюча речовина: настойки із валеріани коренів (1:5) – 25 мл;
допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка для перорального застосування.
Прозора рідина червоно-бурого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"
Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група.
Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M09.

Біологічно активні речовини, які містяться у валеріани кореневищах з коренями (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри) зменшують процеси збудження в центральній нервовій системі. Препарат чинить заспокійливу та спазмолітичну дію.

Показання для застосування.
Функціональні розлади діяльності центральної нервової системи (підвищена емоційна збудливість, дратівливість, невротичні стани, розлади сну), серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії).

Протипоказання.
Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи; індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, які входять до складу препарату.
Діти віком до 12 років. Період вагітності та годування груддю.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат не застосовується у період вагітності та годування груддю через вміст етанолу 70 %.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботи з іншими механізмами.
На період лікування препаратом слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно-небезпечними механізмами у зв'язку із вмістом етанолу 70 % та можливістю розвитку побічних ефектів з боку ЦНС.

Діти.
Препарат містить етанол 70 %, тому не рекомендується застосовувати його дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.
Приймають внутрішньо після їжі.
Дорослим рекомендується приймати по 20 - 30 крапель настойки 3 – 4 рази на добу, дітям віком понад 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 – 4 рази на добу.

Передозування. При значному перевищенні рекомендованих доз препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість або психічне збудження, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, відчуття серцебиття.
У разі передозування слід припинити застосування препарату. Терапія симптоматична (промивання шлунка, прийом активованого вугілля).

Побічні ефекти.
Рідко можуть спостерігатися пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності.
Можливі алергічні реакції (почервоніння, висипи, свербіж та набрякання шкіри).
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Валеріани настойка має здатність потенціювати дію серцевих, седативних, снодійних, анагетичних засобів та спазмолітичних засобів.

Термін придатності.
5 років.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.
Без рецепта.