

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки плодів глоду (Tinctura crataegi) (1:10);

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина червонувато-жовтуватого кольору; допускається утворення осаду при зберіганні.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ Виробнича фірма «САРЕПТА».

Україна, м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються в кардіології. Код АТС С01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться в плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хв – 1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії), а також як допоміжний засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років. Вагітність, період годування груддю.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендують приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі. Хворим з тяжкою артеріальною гіпотензією та/або брадикардією не слід застосовувати препарат без попередньої консультації з лікарем.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Оскільки до складу препарату входить етанол, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується застосовувати внутрішньо дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Приймають внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настоянки 3 рази на день, дітям старше 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на день до досягнення стабільного лікувального ефекту (нормалізація артеріального тиску, зменшення серцебиття). Тривалість лікування визначається індивідуально.

Передозування.

При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардія, які вимагають припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти.

Рідко спостерігаються сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (почервоніння та висипи на шкірі, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів. Прийом з солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом з антиаритмічними засобами третього покоління, а також цизапридом.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.