

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ОКСОЛІН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: оксолін;
10 г мазі містять оксоліну 25 мг;
допоміжні речовини: масло мінеральне.

Лікарсько фарма. Мазь.

Мазь від білого до світло-жовтого кольору. При зберіганні допускається поява рожевого відтінку.

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ НИЖФАРМ. Російська Федерація, 603950, Нижній Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.

Фармакотерапевтична група. Протівірусні засоби. Код АТС S01A D10 .

Оксолін – протівірусний засіб для зовнішнього застосування, має вірусцидну активність, блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (здебільшого типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного моллюску.

Препарат нетоксичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20 %, виводиться здебільшого нирками протягом доби.

Показання для застосування. Профілактика грипу; лікування вірусного риніту.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату у період вагітності та годування груддю відсутні. Препарат не бажано застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість нервово-м'язової провідності, у рекомендованих дозах його можна застосовувати особам, які керують автотранспортом та працюють зі складними механізмами.

Діти. Застосовують дітям старше 2 років.

Спосіб застосування та дози.

Для профілактики грипу – щоденно 2–3 рази на день наносити на слизову оболонку носа протягом 25 днів або при контакті з хворими.

Лікування вірусного риніту: щоденно 2–3 рази на день наносити на слизову оболонку носа протягом 3-4 днів.

Передозування. Випадки передозування невідомі. При передозуванні Оксоліну можливе виникнення подразнення шкіри та слизових оболонок у місці нанесення препарату та ринорея.

Лікування: припинити застосування препарату, залишки мазі змити теплою водою.

Побічні ефекти. У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає, ринорея, забарвлення слизової оболонки у синій колір.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від +5 до +15 °С.

Упаковка. Алюмінієві туби по 10 г.

Категорія відпуску. Без рецепта.