ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПРОПРОТЕН-100
(PROPROTEN-100)

Загальна характеристика:
основні фізико-хімічні властивості: таблетки від білого до білого з кремуватим або білого з сіруватим відтінком кольору, плоско-циліндричної форми, з рискою та фаскою, з гладкою однорідною поверхнею. На плоскій стороні з рискою нанесено напис - MATERIA MEDICA, на другій плоскій стороні нанесено напис - PROPROTEN 100;
склад: 1 таблетка містить антитіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінно очищені С 1000 – 0,003 г;
допоміжні речовини: лактоза, кальцію стеарат або магнію стеарат, целюлоза мікрокристалічна.

Форма випуску. Таблетки гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при алкогольній залежності.
Код АТС N07B B10.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Препарат поліпшує психічні (збудження, дратівливість, тривожність, депресію, безсоння, потяг до спиртного), неврологічні (тремор, головний біль) та осмотичні (пітливість, тахікардію, артеріальну гіпертензію, порушення травлення) прояви алкогольного абстинентного синдрому.
Фармакокінетика. Не вивчена.

Показання для застосування. Алкогольний абстинентний синдром легкого та середнього ступенів тяжкості; профілактика алкоголізму.

Спосіб застосування та дози. Приймати за 15 - 20 хв до їди, таблетку тримати у роті до повного розсмоктування.
У перші 2 год (при стані похмілля) приймати по 1 таблетці кожні 30 хв; *у наступні 8 - 10 год* – по 1 таблетці кожну годину. У разі настання сну прийом препарату поновлювати після пробудження. У подальшому при покращанні стану препарат призначають по 1 таблетці кожні 2 - 3 год (4 - 6 таблеток на добу) до повного зникання проявів алкогольної абстиненції.
При тяжких симптомах алкогольної абстиненції або відсутності ефекту протягом 12 год з моменту початку лікування терапію необхідно комбінувати з лікарськими засобами, які застосовуються традиційно при детоксикації.
Для профілактики рецидивів з метою зменшення патологічного потягу до алкоголю приймати по 1 - 2 таблетки на добу протягом 2 - 3 місяців.

Побічна дія. Поодинокі короткочасні випадки (5 - 10 хв) порушення акомодації (“двоїння” в очах).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Випадки передозування не спостерігалися.

Особливості застосування. За відсутності покращання на третій день лікування препаратом необхідно звернутися за консультацією до лікаря. Дослідження впливу препарату у періоди вагітності і лактації не проводились.
Вплив на керування автотранспортними засобами або іншими складними механізмами.
При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не виявлено.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 С. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 20 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки у картонній коробці.

Виробник. ТОВ “НВФ “Матеріа Медика Холдинг”, Російська Федерація.

Адреса. Росія, 103064, м. Москва, Яковоапостольський пров., буд. 11/13.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com