

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФАСТ РЕЛІФ
(FAST RELIEF)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь рожевого кольору, з характерним запахом;

склад: 100 г мазі містять:

пудина ка пул (ментол)	- 10 г,
карпур (камфора)	- 3 г,
гаултерія ка тел (олія вінтергринова)	- 20 г,
аджован ка пул (тимол)	- 0,2 г,
нілгірі ка тел (олія евкаліптова)	- 3,5 г,
тарпін ка тел (олія терпіннова)	- 1 г,
лаванг ка тел (олія гвоздична)	- 0,3 г;

допоміжні речовини: парафін рідкий і легкий рідкий, віск мікрокристалічний, парафін твердий, озокерит, барвник СІ 26100.

Форма випуску. Мазь.

Фармакотерапевтична група. Засоби для місцевого застосування при суглобовому і м'язовому болю. Код АТХ М02 АХ.

Фармакологічні властивості. Компоненти мазі Фаст Реліф швидко проникають тільки в ушкоджені ділянки. Після проникнення активні інгредієнти стимулюють циркуляцію крові, розслаблюють напружені м'язи та збільшують доступ кисню до уражених тканин. олія олія Олія вінтергринова: полегшує гострий біль в суглобах, при ішіасі, неврологічному болю (невритах, невралгіях).

Камфора: має протибольову дію при артритах, міозитах, тендовагінітах

Евкаліптова олія: зігрівальний засіб при ревматизмі.

Терпіннова олія: в основному використовується як зігрівальний засіб при різних больових проявах, обумовленими артритами, міозитами та неврологічними болями.

Тимол: ефективний при гострому болю суглобів, як загального походження, так і після травми.

Показання для застосування.

Артралгія, артрити, міалгія, міозити, тендиніт, тендовагініт, ішіас і неврологічний біль, плечолопатковий синдром.

Спосіб застосування та дози. Тільки для зовнішнього застосування.

Дорослим та дітям віком старше 5 років наносити тонким шаром на болючі ділянки і втирати доти, доки мазь не всмокчеться. Курс лікування 7-10 днів.

Застосовувати препарат можна 2-3 рази на добу.

Побічна дія. Препарат, звичайно, добре переноситься. Як і при застосуванні будь-яких інших ліків можливі алергічні реакції на компоненти препарату.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Прояви передозування не спостерігалися.

Особливості застосування. Слід уникати потрапляння мазі на слизову оболонку очей та порожнини рота. Не рекомендується наносити мазь на ушкоджені ділянки.

Вагітність та лактація.

Хоча немає повідомлень про шкідливість застосування препарату Фаст Реліф у період вагітності та лактації, як і будь-які інші ліки, його слід застосовувати тільки у випадку, коли потенційна користь для матері перевищує можливий ризик для плода.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та механізмами.

Не встановлений.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.

Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому місці при температурі до 30°C.

Захищати від дії прямих сонячних променів і подалі від джерела тепла.

Термін придатності. 3 роки з дати виготовлення.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка.

По 3 г, 12 г, 25 г і 50 г мазі у пластикових тубах; у картонній упаковці.

Виробник. Емамі Лімітед.

Адреса. Індія, Кольката- 700056, вул.13Б.Т.Роуд.