

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

УРОСЕПТ
(UROSEPT)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: піпемідова кислота;

хімічна назва: 2-піперазін-5-оксо-8-етил-5,8-дигідро-пірідо(2,3-d)-піримідин-6-карбонова кислота;

основні фізико-хімічні властивості: супозиторії білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, сигароподібної форми;

склад: 1 супозиторій містить 0,20 г кислоти піпемідової тригідрату у перерахунку на суху речовину;

допоміжні речовини: твердий жир, до отримання супозиторія масою 1,4 г.

Форма випуску. Супозиторії.

Фармакотерапевтична група. Група уроантисептиків або засоби, які застосовуються при інфекційних захворюваннях сечовивідних шляхів – група G04A.

Фармакологічні властивості. Уроантисептик хінолонового ряду. Діє бактерицидно, має активність відносно більшості грамнегативних мікроорганізмів, а також відносно деяких грампозитивних мікроорганізмів, зокрема до *Staphylococcus aureus*.

Фармакокінетика. Максимальна концентрація препарату у плазмі крові визначається через 2-3 години після прийому і співпадає з часом максимальної концентрації препарату у сечі. Екскретується нирками в незмінному вигляді.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання, які викликані чутливими до піпемідової кислоти мікроорганізмами, в т.ч. пієлонефрит, уретрит, цистит, простатит.

Спосіб застосування та дози. Призначають по 1 супозиторію вагінально або ректально 2 рази на добу протягом 10 днів. При необхідності дози збільшують до 3 супозиторіїв, тобто по 1 супозиторію 3 рази на добу.

Побічна дія. Можливі нудота, блювання, діарея, алергічні реакції у вигляді висипу на шкірі.

Протипоказання. Виражені порушення нирок (КК менше 10 мл/хв), виражені порушення функції печінки, і триместри вагітності, дитячий вік, підвищена чутливість до піпемідової кислоти.

Передозування. При появі нудоти, блювання тимчасово припинити прийом препарату.

Особливості застосування. У процесі лікування належить уникати ультрафіолетового опромінення у зв'язку з високим ризиком виникнення фотосенсибілізації; збільшити кількість спожитої рідини (під контролем диуреза). Активність препарату зростає при вилужуванні сечі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлені будь-які взаємодії піпемідової кислоти з лікарськими засобами.

Умови та термін зберігання. У сухому, прохолодному, захищеному від світла місці.
Термін зберігання – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. В пачці по 10 (5x2) супозиторіїв у контурних чарункових упаковках.

Виробник. ЗАТ “Лекхім-Харків”.

Адреса. Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.