

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕКОНАЗОЛ
(ECONAZOLE)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: econazole; 1 - {2,4-дихлоро- β -[п-хлоробензил)окси]фенілетил} імідазол нітрат;

основні фізико-хімічні властивості: гель білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору;

склад: 1 г гелю містить еконазолу нітрату (у перерахунку на 100% речовину) – 10 мг;

допоміжні речовини: ніпагін (метилпарагідроксибензоат), карбомер (карбопол) 934 Р, гліцерин дистильований (гліцерол), аміаку розчин 15%, спирт етиловий 96%, масло вазелінове, твін-80 (полісорбат 80), вода очищена.

Форма випуску. Гель для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові препарати для зовнішнього застосування. Еконазол. Код АТС D01A C03.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Протигрибковий препарат групи похідних імідазолу, який має широкий спектр протигрибкової дії.

Механізм дії полягає в пригніченні біосинтезу ергостеролу і зміні ліпідного складу мембрани грибів. Виявляє фунгіцидну і бактерицидну дію. Активний щодо дерматофітів (*Trichophyton* spp., *Epidermophyton* spp., *Microsporum* spp.), дріжджів (*Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Rhodotorula* spp., *Malassezia furfur*), пліснявих грибів (*Aspergillus* spp., *Cladosporium* spp., *Scopulariopsis brevicaulis*), деяких грампозитивних бактерій (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Nocardia minutissima*).

Фармакокінетика. При нанесенні на шкіру системна абсорбція незначна. Активна речовина концентрується в епідермісі та дермі. Клінічний ефект розвивається протягом трех днів лікування.

Показання для застосування. Дерматомікози, мікози стоп, шкірний кандидоз, різнобарвний лишай, оніхомікози і пароніхії.

Спосіб застосування та дози. Гель наносять 1 - 2 рази на добу на уражені ділянки шкіри тонким шаром і злегка втирають. Тривалість лікування звичайно становить 2 – 4 тижні.

Побічна дія. Можливі місцеві реакції: подразнення, відчуття печіння та свербіжу, почервоніння шкіри, висип.

Протипоказання. Підвищена чутливість до похідних імідазолу та інших компонентів препарату.

Передозування. При наскірному застосуванні передозування не описане.

Особливості застосування. У період вагітності та лактації еконазол призначають з обережністю. Для запобігання рецидивів дерматомікозів ніг і тулуба потрібне лікування тривалістю не менш двох тижнів, а мікозів стоп – не менш одного місяця. При відсутності ефекту в зазначений термін терапію варто припинити і переглянути діагноз. З появою перших симптомів, які свідчать про підвищену чутливість або подразнення шкіри, прийом еконазолу слід припинити.

Слід уникати потрапляння препарату в очі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від +10 до +20 °С. Термін придатності 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 15 г гелю в алюмінієвій тубі. По 1 тубі у пачці з картону.

Виробник. ВАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Адреса. Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.
Тел/факс (057) 733-07-04, 733-10-96.