

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РОЗТОРОПШІ ПЛОДИ
(FRUCTUS SILIBI MARIANI)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: шматочки плодів різної форми, що проходять крізь сито з отворами 3 мм; колір від чорного до світло-жовтого, іноді з бузковим відтінком; запах відсутній; смак злегка гіркуватий;

склад: плоди розторопші плямистої.

Форма випуску. Плоди.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Код АТС А05В А50**.

Фармакологічні властивості. Біологічноактивні речовини, що містяться в плодах розторопші плямистої (флавоноїд силімарин і його головний ізомер силібін), обумовлюють гепатопротекторну, жовчогінну, холеретичну, мембраностабілізуючу дію препарату, а саме: нормалізують обмінні процеси в печінці, підвищують стійкість гепатоцитів до дії негативних чинників навколишнього середовища, сприяють більш швидкому відновленню паренхіми печінки та її фізіологічних функцій, а також посилюють утворення та виділення жовчі, секреторну та рухову функції шлунково-кишкового тракту.

Показання для застосування. Хронічні гепатити, холецистити, цирози печінки, жирова дистрофія печінки, токсичні ураження печінки.

Спосіб застосування та дози. Дорослим: по 1 чайній ложці подрібнених плодів за 30 хв. до їжі, запиваючи водою, 3 - 5 разів на день протягом 45 - 60 днів, 2 - 3 рази на рік.

Можливо заварювання препарату та застосування його у виді настою: 1 чайну ложку плодів заливають однією склянкою окропу, настоюють 10 - 20 хвилин і проціджують. Приймають теплим, невеликими ковтками, по 1 склянці 3 рази на день: вранці натщесерце, в обід за 30 хв. до їжі та увечері перед сном.

Побічна дія. Звичайно препарат добре переноситься хворими, але можливі – проносна дія, збільшення діурезу.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Передозування. Не спостерігалось.

Особливості застосування. Жінкам в періоди вагітності та лактації рекомендується застосовувати препарат тільки за життєво необхідними показаннями, під контролем лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія з іншими препаратами не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C . Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 г, 100 г, 200 г у пачці з внутрішнім пакетом, по 100 г у контейнерах.

Виробник. Відкрите акціонерне товариство «Фітофарм».

Адреса. Україна, 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.