

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТРОКСЕРУТИН
(TROXERUTINUM)

Загальна характеристика:

хімічна назва: суміш 3, 4, 7 – три (2-гідроксіетил) рутозидів;

основні фізико-хімічні властивості: гель світло-жовтого або жовтого кольору, однорідної консистенції;

склад: 1 г гелю містить троксерутину 0,02 г;

допоміжні речовини: ніпагін (метилпарагідроксibenзоат), карбомер (карбопол) 934 Р, триетаноламін, динатрію едетат, вода очищена.

Форма випуску. Гель для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовуються при хронічній венозній недостатності. Троксерутин. Код АТС С05С А04.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат має ангіопротекторні властивості, зменшує проникність судин, сприяє нормалізації мікроциркуляції та трофіки тканин, зменшує застійні явища у венах і паравенозних тканинах, виявляє протинабрякову та протизапальну дію.

Фармакокінетика. Не досліджена.

Показання для застосування. Явища набряково-больового синдрому та мікроциркуляторно-трофічних порушень при гострій або хронічній венозній недостатності вен нижніх кінцівок і прямої кишки (варикозне розширення вен, гострий і хронічний тромбофлебіт, посттромбофлебітичний синдром, хронічний лімфостаз, гострі тромбози гемороїдальних вузлів), а також при травмах м'яких тканин (удари, розтягнення, гематоми).

Спосіб застосування та дози. Препарат наносять 2-3 рази на добу рівномірним тонким шаром на уражену ділянку, злегка втираючи у шкіру. Не наносять гель на відкриті рани. Курс лікування - від 2 тижнів до 2 місяців. При рецидивах захворювання курс лікування можна повторювати 2-3 рази на рік.

Побічна дія. В окремих хворих можливі алергічні реакції (шкірний висип, свербіж).

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Випадки передозування гелю Троксерутин при нашкодному застосуванні не описані.

Особливості застосування. Для підвищення ефективності терапії можливо застосування оклюзійних пов'язок.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі 8-15 °С.

Термін придатності - 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 35 г гелю в алюмінієвих тубах.

Виробник. ВАТ «ХФЗ «Червона зірка».

Адреса. Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Тел./факс: (057)733-10-96, 733-07-04.

