

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ІНГАЛПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 балон (30 мл) або флакон (50 мл) препарату містить стрептоциду розчинного 0,75 г або 1,25 г, сульфатіазолу натрію (гексагідрату) у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний 0,54 г або 0,9 г, тимолу 0,015 г або 0,025 г, олії евкаліптової 0,015 г або 0,025 г, олії м'яти перцевої 0,015 г або 0,025 г, шавлії лікарської листя екстракту рідкого (1:10) 1,26 г або 2,1 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, цукор-рафінад, гліцерин, полісорбат, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей для ротової порожнини.

Прозора рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, які застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Фармакологічні ефекти препарату обумовлені дією компонентів, які входять до його складу. Стрептоцид розчинний і сульфатіазол натрію чинять антимікробну дію щодо грамположитивних і грамнегативних бактерій, які спричиняють захворювання порожнини рота і глотки. Тимол має антисептичну, відхаркувальну та спазмолітичну дію. Олія евкаліптова виявляє протизапальну і антисептичну активність. Шавлія чинить інтенсивну протимікробну дію, яка підсилюється дією евкаліптової олії.

Олія м'яти перцевої при нанесенні на слизові оболонки виявляє помірний місцевоанестезуючий ефект.

Комбінація вказаних компонентів препарату забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань слизової оболонки ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів. Препарат виявляє протизапальний, протимікробний і протигрибковий ефекти; активний відносно грамположитивних і грамнегативних бактерій, а також грибів роду *Candida*.

Показання для застосування.

Місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів і слизової оболонки порожнини рота (тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтозний і виразковий стоматити).

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату (у тому числі непереносимість сульфаніламідів, ефірних олій або інших компонентів препарату). Дитячий вік до 2 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Неприпустиме попадання препарату в очі.

Перед застосуванням препарату проконсультуйтеся з лікарем! Без консультації лікаря не застосовуйте препарат понад встановлений термін!

Особливі застереження.

Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт. Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15 - 30 хв.

При застосуванні препарату дітям слід враховувати, що одноразова доза препарату, яка розпилюється за 1 - 2 секунди, містить 0,0076 - 0,0152 мл етанолу (96 %), що становить на однократний прийом: для дітей віком 2 - 5 років (маса тіла – 12 - 21 кг) 0,0004 - 0,0013 мл/кг, віком 6 - 12 років (маса тіла – 21 - 38 кг) 0,0002 - 0,0007 мл/кг.

Обов'язково повідомте лікаря про Вашу попередню реакцію на прийом препаратів цієї групи.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказань щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю немає, але необхідно суворо дотримуватися режиму дозування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами і механізмами, однак водіям автотранспорту слід враховувати можливе спотворення результатів дослідження на алкоголь.

Діти.

Досвід застосування препарату дітям віком до 2 років відсутній.

З обережністю застосовують дітям у зв'язку з можливістю розвитку рефлекторного бронхоспазму.

Спосіб застосування та дози.

Призначають дорослим і дітям старше 2 років місцево на слизові оболонки порожнини рота і носоглотки шляхом зрошування, розпилюючи препарат у порожнину рота протягом 1 - 2 секунд.

Дорослим зрошування проводять 3 - 4 рази на добу.

Дітям старше 2 років зрошування проводять 1 - 2 рази на добу, якщо немає особливих вказівок лікаря.

Тривалість застосування препарату залежить від перебігу захворювання і зазвичай становить 3 - 10 днів.

Частота і тривалість застосування встановлюються індивідуально лікарем і залежать від тяжкості захворювання!

Правила користування балоном/флаконом.

1. Зняти запобіжний ковпачок з балона/флакона.

2. На шток клапана балона надіти насадку горлову (розпилювач), яка додається, переконавшись попередньо в її чистоті.

3. Струшувати балон/флакон протягом 1 хв і провести не більше 5 натиснень на насадку до появи дисперсного струменя. Дозволяється при відсутності струменя повторити дію ще раз.

4. Вільний кінець розпилювача ввести в порожнину рота і, утримуючи балон вертикально, натиснути на головку розпилювача. Тривалість розпилювання – 1 - 2 секунди.

5. Закінчивши зрошування, зняти розпилювач зі штока клапана балона і закрити балон запобіжним ковпачком, щоб запобігти його забрудненню.

6. Розпилювач слід тримати в чистоті, щодня промиваючи його під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплому місці.

Передозування.

Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів препарату.

Лікування: відміна препарату, промивання порожнини рота теплою кип'яченою водою.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, але в окремих випадках можливі нудота, блювання, місцеві ефекти (відчуття печіння у роті або першіння), алергічні реакції.

У дітей можливі бронхоспазм.

У разі виявлення будь-яких небажаних явищ або невичайних реакцій порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості застосування препарату!

При одночасному застосуванні з препаратами-похідними параамінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн) можливе послаблення протимікробної дії препарату Інгаліпт-Здоров'я.

Термін придатності.

1,5 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

1 балон по 30 мл разом з насадкою та запобіжним ковпачком в коробці;

1 флакон по 50 мл з оральним розпилювачем та запобіжним ковпачком у коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.