

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАКРОВІТ
(МАКРОВІТ)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: круглі таблетки, вкриті оболонкою оранжевого кольору;

склад: 1 таблетка містить

ретинолу (вітамін А у вигляді ретинолу пальмітату)	1500 МО,
холекальциферолу (вітамін Д ₃)	100 МО,
кислоти аскорбінової (вітамін С)	80 мг,
нікотинамиду	5 мг,
□-токоферолу ацетату (вітамін Е)	5 мг,
кальцію пантотенату	5 мг,
рибофлавіну (вітамін В ₂)	0,6 мг,
тіаміну мононітрату (вітамін В ₁)	0,5 мг,
піридоксину (вітамін В ₆)	1 мг,
ціанокобаламіну (вітамін В ₁₂)	2 мкг;

допоміжні речовини: сахароза, лактози моногідрат, сорбітол, полісорбат 80, гліцерин, олія рицинова, глюкоза рідка, магнію стеарат, капол 600 фарма, повідон, агент протипінний, барвник жовтий (Е 110), титану діоксид (Е 171), ароматизатор із запахом персика, ароматизатор із запахом мандарина, манітол.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Полівітамінні комплекси без добавок. Код АТС А11ВА.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Таблетки містять 10 найважливіших вітамінів, які беруть участь у регуляції багатьох біохімічних процесів в організмі. Вітаміни групи В (В₁, В₂, В₆), пантотенова кислота та нікотинамід беруть участь у процесах обміну вуглеводів, білків і жирів, а також вони важливі для функціонування нервової системи. Вітамін А потрібен для розвитку клітин епітелія та для синтезу зорового пігменту. Вітамін Д регулює засвоєння кальцію та сприяє належній мінералізації кісток і зубів. Вітамін С контролює всмоктування заліза і бере участь у багатьох окисно-відновних процесах в організмі. Вітамін Е, фізіологічний антиоксидант, захищає мембрани клітин від ушкоджень і зберігає їх функціональність.

Фармакокінетика. Фармакокінетичні параметри не визначалися.

Показання для застосування.

- Фізичні і психічні перенавантаження (при навчанні, на роботі або вдома);
- заняття активними видами спорту та активним відпочинком;
- недостатнє вживання їжі (люди похилого віку, курці, алкоголіки);
- нерегулярне та одноманітне харчування (в основному, суха їжа, нерегулярне вживання їжі);
- при дістах для схуднення;
- під час вагітності та годування груддю;
- сезонний дефіцит фруктів та овочів в раціоні.

Спосіб застосування та дози.

Діти віком від 6 до 14 років - по 1 таблетці на добу.

Дорослі та діти старше 14 років - по 1 таблетці 2-3 рази на добу. Таблетку Макровіт розсмоктують

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

після їди.

Таблетки приймаються протягом місяця. Курс лікування можна повторювати 2-3 рази на рік.

Побічна дія. В осіб з підвищеною чутливістю до будь-якого інгредієнта препарату можуть виникати реакції гіперчутливості.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату. Гіпервітаміноз А і D. Діти віком до 6 років.

Передозування. Тривале вживання високих доз може спричинити гіпервітаміноз А і D, хоча ймовірність передозування мінімальна. При передозуванні вітаміну D виникають слабкість, анорексія, нудота, блювання, діарея, зниження маси тіла, гарячка, судом. Передозування вітаміну А може призвести до головного болю, запаморочення, порушення сну, нудоти, блювання, сонливості, світлобоязні і судом. При появі вищезазначених симптомів, слід припинити прийом препарату і провести симптоматичне лікування.

Особливості застосування.

Хворі на цукровий діабет можуть застосовувати цей препарат, але вони повинні враховувати, що у кожній таблетці міститься 0,61 г сахарози і 0,15 г глюкози, а у добовій дозі міститься від 0,61 г до 1,8 г сахарози і від 0,15 г до 0,45 г глюкози.

Перед тим, як розпочати приймати паралельно інші вітамінні препарати, мінерали з вітамінами та/або мінерали, необхідно звернутися до лікаря.

Вагітність і годування груддю.

Вагітні та жінки, які годують груддю, можуть приймати препарат лише за рекомендацією лікаря.

Вплив на здатність керувати автомобілем та іншими механічними засобами

Не впливає на здатність керувати автомобілем та працювати з іншими механічними засобами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Комбінації з іншими засобами, які містять вітаміни, можуть призводити до гіпервітамінозу.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25°C в захищеному від вологи та світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 30 таблеток, вкритих оболонкою (3 блістери по 10 таблеток) в картонній коробці.

Виробник. КРКА, д.д., Ново место.

Адреса. Шмар'ешка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія.