

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РЕВІТ
(REVIT)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: драже від жовтого до оранжевого кольору. За зовнішнім виглядом драже повинні мати правильну кулеподібну форму. Поверхня драже повинна бути гладкою, однорідною за забарвленням; Допускається наявність специфічного запаху.

склад: 1 драже містить вітаміну А (ретинолу ацетату) 0,86 мг (2 500 МО), вітаміну В₁ (тіаміну) 1 мг, вітаміну В₂ (рибофлавіну) 1 мг, вітаміну С (кислоти аскорбінової) 35 мг;

допоміжні речовини: борошно пшеничне, патока крохмальна, цукор-пісок, олія м'яти перцевої або есенція ароматична харчова, віск бджолиний, олія соняшникова, тальк.

Форма випуску. Драже.

Фармакотерапевтична група. Полівітамінні препарати без добавок. Код АТС А11В А.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Фармакологічні властивості Ревіту зумовлені вітамінами, що входять до складу активних інгредієнтів препарату.

Вітамін А забезпечує нормальний розвиток епітеліальних клітин і синтез пігменту зору.

Вітамін В₁ – необхідний кофермент у метаболізмі вуглеводів і передачі нервового імпульсу.

Вітамін В₂ є частиною ФМН і ФАО (флавімононуклеотид і флавінаденіндинуклеотид), які беруть участь в окисно-відновних процесах у складі дегідрогеназ та оксидаз.

Вітамін С необхідний для росту і нормального стану кісток, шкіри, зубів, капілярного ендотелію та імунної системи, прискорює засвоєння заліза, бере участь у багатьох окисно-відновних процесах в організмі.

Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату не досліджувалась.

Показання для застосування. Як профілактичний і лікувальний засіб при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах (підвищене фізичне та нервово-психічне навантаження, особливо при несприятливих умовах зовнішнього середовища); при недостатньому засвоєнні харчових продуктів (людям середнього та похилого віку, курцям, алкоголікам); у період одужання після перенесених захворювань; для підвищення опірності організму до інфекційних і застудних захворювань.

Спосіб застосування та дози. Препарат приймають внутрішньо, після їди: з лікувальною метою дорослі приймають по 1 драже 3 рази на добу; діти від 3 до 7 років - по 1 – 2 драже на добу, від 7 до 15 років – по 2 – 3 драже на добу. Тривалість курсу лікування залежить від характеру захворювання і може становити 1 – 2 місяці. З профілактичною метою дорослі приймають по 2 драже на добу, люди похилого віку - по 3 драже на добу, діти старше 10 років – по 1 драже на добу протягом 20 – 30 днів.

Побічна дія. Рекомендовані дози звичайно добре переносяться. У деяких осіб, однак, можуть виникати такі побічні ефекти, як дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Для його попередження бажано приймати препарат після їди. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до інгредієнтів препарату. Гіпервітаміноз А. Вік до 3 років.

Передозування. Тривалий прийом занадто великих доз препарату може спричинити гіпервітаміноз А.

Особливості застосування. Не застосовують разом з лікарськими засобами, що містять вітаміни. З обережністю призначають при тяжких ураженнях печінки, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки. У періоди вагітності та лактації препарат застосовують тільки у випадку, коли очікувана користь переважає потенційний ризик для плода.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. *Вітамін В₁*, впливаючи на процеси поляризації в ділянці нервово-м'язових синапсів, може послаблювати курареподібну дію. *Вітамін С* посилює дію та токсичність сульфаніламідів (можливість кристалури). Абсорбція вітаміну С знижується при одночасному застосуванні пероральних контрацептивних засобів, вживанні свіжих фруктів або овочевих соків, лужних напоїв.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі 15 – 25 °С.

Термін придатності - 1 рік.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 80 або по 100 драже у пластмасовому контейнері.

Виробник. ВАТ ”Вітаміни”.

Адреса. Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської ”Іскри”, 31.