

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БАЛЬЗАМ “ВІГОР”
(BALSAMUM “VIGOR”)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина золотисто-коричневого кольору, із специфічним запахом;

склад: водно-спиртовий екстракт із 9 рослин (кореневище айру тростинного 0,325 г, листя бобівника трилистого 0,065 г, трава деревію 0,432 звичайного, кора дуба звичайного 0,0325 г, плоди кропу пухнастого 0,185 г, кореневища з коренями левзеї (великоголовника) 0,03 г, квіти липи серделистої 0,3775 г, листя м'яти перцевої 0,135 г, трава полину гіркого 0,065 г);

Допоміжні речовини: колер, цукровий пісок, спирт етиловий 96%, вода очищена.

Форма випуску. Бальзам для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

Фармакологічні властивості. Бальзам “Вігор” має адаптогенну, антистресову, антитоксичну, протизапальну дію, покращує розумову та фізичну працездатність, сприяє травленню, нормалізації функцій серцево-судинної системи. Препарат підвищує резистентність організму до різних ендо- та екзогенних факторів, гіпоксії, активує ретикулоендотеліальну систему, має певний імунокоригуючий ефект та антиалергічні властивості.

Показання для застосування. Фізичні та емоційні перевантаження, стреси, астено-вегетативний синдром (втомованість, зниження працездатності, неврастенія, порушення сну); запалення верхніх дихальних шляхів; період реконвалесценції після тяжких інфекційних захворювань. Як профілактичний засіб особам, які працюють в умовах впливу хімічних, променевих і температурних факторів та з метою покращання імунітету.

Спосіб застосування та дози. Бальзам “Вігор” призначають дорослим внутрішньо, по 20 - 30 мл 2 - 3 рази на добу, під час їди. Курс лікування становить 14 днів, за необхідності може бути продовжений до 30 днів.

Повторний курс можливий після перерви прийому препарату тривалістю 5 - 7 днів.

Побічна дія. Може спостерігатися індивідуальна непереносимість компонентів препарату, у таких випадках препарат відмінюють. При тривалому застосуванні препарату можливий розчиток алкогольної залежності.

Протипоказання. Бальзам “Вігор” не рекомендується приймати при гострих і хронічних отруєннях різними хімічними речовинами, при тяжких формах ішемічної хвороби серця та есенціальної гіпертензії; виражених порушеннях функції печінки та нирок; епілепсії; хворим

на алкоголізм; вагітним, жінкам у період лактації; дітям до 16 років; при підвищеній чутливості до компонентів препарату.

Передозування.

Симптоми: ознаки сп'яніння, пригнічення дихання, при тяжкому отруєнні – коматозний стан.

Лікування: негайне видалення препарату зі шлунка (штучне блювання та промивання шлунка), симптоматична терапія; у тяжких випадках – інфузійне введення 40% розчину глюкози з тіаміну хлоридом, оксигенотерапія, форсований діурез, апаратне дихання.

При довготривалому застосуванні бальзаму у дозах, що перевищують рекомендовані, можливо підвищення артеріального тиску, головний біль, розвиток залежності від алкоголю.

Особливості застосування. Препарат не призначають особам, операторська діяльність яких потребує підвищеної уваги; препарат може впливати на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні бальзаму з нітрофуранами, метронідазолом можливий розвиток антабусоподібного ефекту, з пероральними протидіабетичними препаратами, похідними сульфанілової кислоти – розвиток гіпоглікемічної коми, з кислотою ацетилсаліциловою – підвищення ризику розвитку виразки шлунка, зі снодійними засобами – пригнічення дихального центру.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі до 25 С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 200 мл, 500 мл бальзаму у пляшках.

Виробник. ТОВ “АВЕТРА”.

Адреса. Україна, 90260, с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області.