Загальна характеристика:
міжнародна та хімічна назви: еналаприл, L-пролін,1-[N-[1-(етоксикарбоніл)-3-фенілпропіл]-L-ала- ил]-,(S)-,(Z)-2-бутендіоат (1:1). 1-[N-[(S)-1-карбокси-3-фенілпропіл]-L-аланіл]-L-пролін 1'-складний етиловий ефір, малеат (1:1);
індапамід, (RS)-4-хлоро-3-сульфамол-N-(2-метіл-2,3 дигідро-1H-індол-1-іл)бензамід;
основні фізико-хімічні властивості:
Еналаприл малеат: круглі, двоопуклі таблетки білого кольору(відтру| з|з| ризиком з одного боку|.
Індапамід: круглі, двоопуклі таблетки |світу|, вкриті оболонкою, білого кольору;

склад: 1 таблетка *еналаприлу| малеату* (таблетка більшого розміру|містить|утримує| еналаприлу| малеату| 20 мг ;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію карбонат важкий, желатин, кросповідон[, магнію стеарат|;
1 таблетка, вкрита оболонкою, *індапаміду* (таблетка меншого розміру)|містить: |утримує| індапаміду| 2,5 мг ;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, повідон[К 30, кросповідон[, магнію стеарат|, натрію лаурилсульфат, тальк, метилгідроксипропілцелюлоза |, макрогол-6000, титану діоксид.

Форма випуску. Таблетки; таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ). Еналаприл і діуретики. Код АТС С09В А02.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* ЕНЗИКС® ДУО ФОРТЕ містить|утримує| два окремі лікарські засоби в одній упаковці: інгібітор ангіотензинперетворюючого| ферменту (АПФ) *еналаприл*| і діуретичний засіб|кошт| *індапамід*|.
Еналаприл|
Антигіпертензивний препарат, механізм його дії пов'язаний із зменшенням утворення|утворення| ангіотен-зину II, зниження вмісту|вмісту утримання| якого веде до прямого зменшення виділення альдостерону. При цьому знижується загальний|спільний| периферичний судинний опір і діастолічний артеріальний тиск|тиснення| (АТ), післязвантаження на міокард. Розширює артерії, при цьому рефлекторного підвищення частоти сер Зниження АТ в терапевтичних межах не впливає на мозковий кровообіг. Підсилює|посилює| коронарний і ниркові кровотік. При тривалому застосуванні|вживанні| зменшується гіпертрофія лівого шлуночка міокарда і мощитая стінок артерій резистентного типу, зупиняє прогресування серцевої|серде чної| недостатності і уповільнює|сповільнює|сповільнює| розвиток дилатації лівого шлуночка.
Зниже агрегацію тромбоцитів. Еналаприл(с)|'являється,являється| "проліком": у результаті|унаслідок,внаслідок| його гідролізу утворюється активний метаболіт еналаприлат|, який і інгібує ангіотензинперетворюючий| фермент (АПФ).
Час настання|настуну| гіпотензивного ефекту при пероральному прийомі - 1 година, ви досягає максимуму через 4-6 годин і зберігається протягом 24 години.
Індапамід
Гіпотензивний засіб|кошт|, тіазидоподібний| діуретик з|з| помірною за силою і тривалою дією, похідний бензаміда. Знижує тонус гладенької мускулатури артерій, зменшує загальний|спільний| периферичний опір судин|посудин|. Має помірний салуретичний| і діуретичний ефект, пов'язаний з блокадою реабсорбції іонів

натрію, хлору, водою, і меншою мірою - іонів калію в проксимальних| канальцях і кортикальному| сегменті дистального каналяца нефрону. Судинорозширюючий ефект і зниження загального|спільного| периферичного опору судин|посудин| має в своїй основі такі|слідуючі| механізми: зниження реактивності судинної стінки до норадреналіну і ангіотензину II, збільшення синтезу простагландинів|, що мають судинорозширюючу активніс Антигіпертензивний ефект розвивається в кінці кінц|наприкінці| першого|на початку другого тижня при постійному прийомі препарату і зберігається протягом 24 годин на фон|на фоні| одноразового|одноактного| прийому.
Одночасне застосування|вживання| еналаприлу і індапаміду зумовлює посилення їх антигіпертензивного ефекту.

Фармакокінетика.
Еналаприл|
Після|потім| перорального прийому близько 60% всмоктується з|з| шлунково-кишкового тракту. Одночасне вживання їжі не впливає на всмоктування еналаприлу. Зв'язок з|з| білками плазми крові для еналаприлату становить 50-60 %. Еналаприл швидко і повністю гідролізується| в печінці з|з| утворенням активного метаболіту| - еналаприлату|, який є|'являється,являється| більш активним інгібітором АПФ|, ніж еналаприл|.
Максимальна концентрація еналаприлу в плазмі крові досягається через 1-2 години, еналаприлату| - через 3-4 години. Еналаприлат| легко проходить крізь гістогематичні| бар'єри, за винятком гематоенцефалічного|, невелика кількість проникає крізь плаценту і в грудне молоко.
Період напівзникнення еналаприлату| близько 11 годин. Виводиться еналаприл в основному через нирки|бруньки| 60% (20% - у вигляді еналаприлу) і 40% - у вигляді еналаприлату), через кишечник - 33% (6% - у вигляді еналаприлу) і 27% - у вигляді еналаприлату).
Видаляється під час гемодіалізу (швидкість 62 мл /хв) і перитонеального діалізу.
Індапамід
Після|потім| перорального прийому швидко і повністю всмоктується з|з| шлунково-кишкового тракту; біодоступність висока (93%). Вживання їжі трохи уповільнює|сповільнює|сповільнює| швидкість абсорбції, але|та| не впливає на її повноту. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 1-2 години після|потім| перорального прийому. Рівноважна концентрація встановлюється через 7 днів регулярного прийому. П Метаболізується в печінці. Виркамі(бруньками| виводиться 60 - 80% у вигляді метаболітів (у незміненому вигляді|виді| виводиться близько 5%), через кишечник - 20%. У|в,біля| хворих з|з| ниркову недостатністю фармакокінетика практично не змінюється. Не кумулює|.

Показання для застосування. Артеріальна гіпертензія.

Спосіб застосування та дози. ЕНЗИКС® ДУО ФОРТЕ: 1 таблетку|таблетку| еналаприлу малеату (20 мг) і 1 таблетку|таблетку| індапаміду (2,5 мг) приймають внутрішньо, вранці|уранці| одночасно. Залежно від динаміки показників артеріального тиску|тиснення| доза еналаприлу| малеату може бути збільшена до дворазового прийому на добу (2 таблетки по 20 мг).
Максимальна добова доза еналаприлу малеату | становить 40 мг (2 таблетки по 20 мг), індапаміду – 2,5 мг (1 таблетка).
При хронічній ниркової недостатності кумуляція еналаприлу| настає|настає| при зниженні фільтрації менше 10 мл/хв. При кліренсі креатинину 30-80 мл|/хв доза еналаприлу| малеату повинна становити 5-10 мг /добу (1/4 – 1/2 таблетки по 20 мг).

Побічна дія.
Еналаприл|
З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, слабкість, безсоння, тривога, сплутаність|спутана| свідомості, стомлюваність, сонливість (2-3%), дуже рідко при застосуванні|вживанні| високих доз нервозність, депресія, парестезії, порушення вестибулярного апарату, порушення слуху|чутки| і зору, шум у вухах.
З боку дихальної системи: непродуктивний сухий кашель, інтерстиціальний пневмоніт, бронхоспазм, задишка, риніорея, фарингіт.
З боку травного тракту: сухість у роті|у роті|, анорексія, дисперпепсії| розлади (нудота, діарея або запор, блювання, біль у ділянці живота), кишкова непрохідність, порушення функції печінки і жовчовиділення|, гепатит, жовтуха, панкреатит |жовтуха|.
З боку серцево-судинної системи: виражене зниження АТ, ортостатичний колапс, рідко - загрудинний біль, стенокардія, інфаркт міокарда (звичайно пов'язані з вираженим|виказаним,висловленим| зниженням АТ), аритмії (передсердна брадик| або тахікардія, нерехтіння передсердь), відчуття серцебиття, біолі у ділянці серця, непритомність.
З боку лабораторних показників: гіперкреатинемія, підвищення вмісту|вмісту,утримання| сечовини, підвищення активності "печінкових" ферментів, гіпербілірубінемія, гіперкаліємія. Відмічається в окремих випадках зниження гематокриту| і концентрації гемоглобіну, підвищення ШОЕ, тромбоцитопенія, нейтропенія, агранулоцитоз (у|в,біля| хворих з|з| автоімунними захворюваннями), еозинофілія.
Алергічні реакції: шкірний|шкіряний| висип, ангіоневротичний набряк обличч(обличчя,лиць|, кишок(кишечності|, губ, язика|язика|, голосової щілини і|або гортані, диспноя, поліморфна еритема, ексфоліативний| дерматит, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пемфігус|, свербіж|сверблячка,луд|, кропив'янка|кропивниця|, фотосенсибілізація, серозит, васкуліт, міозит, артралгія, артрит, стоматит, глосит
З боку сечовидільної системи: порушення функції нирок(бруньок|, протеїнурія.
Інші: алопеція, зниження лібідо|порагнення|, риніт|риніт|.

Індапамід
З боку шлунково-кишкового тракту: можливі нудота|анорексія, сухість у роті|у роті|, гастралгія, блювання, діарея, запор, відчуття|почуття| дискомфорту в ділянці живота.
З боку центральної нервової системи: астенія, нервозність, головний біль, запаморочення, сонливість, вертиго, безсоння, депресія; інколи - підвищена стомлюваність, загальна|спільна| слабкість, нездужання, спазм м'язів, напруженість, дратівливість, тривога.
З боку органів чуття: ком'юнктивіт, порушення зору.
З боку дихальної системи: кашель, фарингіт, синусит, інколи - риніт.
З боку серцево-судинної системи: ортостатична гіпотензія, зміни на електрокардіограмі, характери|задача| для гіпокаліємії, аритмії, відчуття серцебиття.
З боку сечовидільної системи: збільшення частоти розвитку інфекцій, ніктурія, поліурія|полуріє|.
Алергічні реакції: шкірний|шкіряний| висип, кропив'янка|кропивниця|, свербіж|сверблячка,луд|, геморагічний васкуліт.
Лабораторні показники: гіпокаліємія, гіпонатріємія|, гіперхлоремічний| алкалоз, підвищення азоту сечовини в плазмі крові, гіперкреатинемія|, глюкозурія, гіперкальціємія|.
Інші: грипоподібний| синдром, біль у грудній клітці, біль у спин|спині|, інфекції| зниження потенції| ,зниження лібідо|порагнення|, риніорея, пітливість, зменшення маси тіла, парестезії, панкреатит, загострення системного червоного вовчака.

Протипоказання.
Еналаприл|
Підвищена чутливість до еналаприлу| і інших інгібіторів АПФ|; наявність в анамнезі ангіоневротичного набряку ідіопатичного, спадкового, пов'язаного з лікуванням інгібіторами АПФ; порушення функції нирок(бруньок| (кліренс креатиніну менше 30 мл|/хв); вагітність; період лактації; вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені|установлені|).
Індапамід
Підвищена чутливість до препарату, інших похідних сульфанаміду або інших компонентів препарату; анурія; гіпокаліємія, виражена|виказана,висловлена| печінкова (в т.ч. з|з| енцефалопатією) і|або ниркова недостатність; гостре порушення мозкового кровообігу; вагітність; період лактації; вік до 18 років (ефективність і безпека не встановлені|установлені|).

Передозування.
Еналаприл|
Симптоми: виражене|виказане,висловлене| зниження АТ.
Лікування: хворого переводять|перекладають,переказують| в горизонтальне положення|становище| з|з| низьким узголів'ям. У легких випадках показано промивання шлунка і прийом внутрішньо сольового розчину. У більш тяжких випадках рекомендовані заходи, спрямовані|спрямовані| на стабілізацію АТ: внутрішньовенне введення|вступ| фізіологічного розчину, плазмозамінників, а за необхідності - ангіотензину II, гемодіаліз.
Індапамід
Симптоми: нудота, блювання, слабкість, порушення функції шлунково-кишкового тракту, водно-електролітні порушення, зниження АТ, запаморочення, сонливість, сплутаність|спутана| свідомості, пригнічення дихання. У|в,біля| хворих на цироз печінки можливий розвиток печінкової коми.
Лікування: промивання шлунка і|або застосування активованого вугілля, корекція водно-електролітного балансу, регідратаційна терапія. Специфічного антидоту немає.

Особливості застосування.
Еналаприл
З|з| обережністю слід призначати еналаприл| при двосторонньому|двобічному| стенозі ниркових артерій, стенозі артерії єдиної нирки(бруньки|, гіперкаліємії, стані після|потім| трансплантації нирки(бруньок|, аортальному стенозі, мітральному стенозі (з|з| порушеннями гемодинаміки), при ідіопатичному гіпертрофічному субаортальному стенозі, системних захворюваних сполучної тканини, ішемічній хворобі серця, цереброваскулярни
Пацієнти повинні перебувати під медичним спостереженням протягом 2 годин після|потім| прийому початкової дози препарату і додатково 1 годину до стабілізації артеріального тиску|тиснення|.
З|з| обережністю призначають пацієнтам з|з| порушеннями функції нирок(бруньок|. Зниження виведення активних інгібіторів АПФ призводить до збільшення їх концентрацій в плазмі крові; до підвищення ризику гіперкаліємії, протеїнурії, нейтропенії і агранулоцитозу. Таким пацієнтам можуть бути необхідними нечасті дози або менш часте їх застосування і пониження збільшення доз.
У разі|в разі| попереднього лікування салуретиками, зокрема у|в,біля| хворих з|з| хронічною серцевою|серде чною| недостатністю, підвищується ризик розвитку ортостатичної гіпотензії, тому перед початком лікування необхідно компенсувати втрату рідини і солей|соль|.
Перед дослідженням функції паращитовидних| залоз еналаприл слід відмінити|скасувати|.
У разі|в разі| розвитку ангіоневротичного набряку обличчя і ші| препарат слід відмінити|скасувати| і призначити антигістамінні засоби. Тяжкі випадки ангіоневротичного набряку язика, голосової щілини і|або гортані потребують екстреного застосування епінефрину і підтримки прохідності верхніх дихальних шляхів (інтубація, трахеотомія).
При хірургічних втручаннях у період лікування еналаприлом| можливий розвиток артеріальної гіпотензії, яку слід коригувати введенням|вступом| достатньої кількості рідини.
Не рекомендується призначати препарат хворим, які знаходяться на гемодіалізі із застосуванням поліакрилонітрильних мембран, перед застосуванням препаратів декстрану або проведенням специфічної десенсибілізації до отрути бджіл і ос, оскільки застосування еналаприлу може призвести до анафілактоїдних| реакцій.
Пацієнтам, які приймають еналаприл, не слід вживати|використовувати| алкоголь через ризик розвитку артеріальної гіпотензії.
У процесі тривалої терапії показаний контроль картини периферичної крові (концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, підрахунок лейкоцитарної формули, визначення швидкості осідання еритроцитів).
Вплив на здатність|здібність| керувати автомобілем, іншою технікою.
Необхідна обережність при керуванні транспортними засобами або виконанні іншої роботи, що вимагає підвищеної уваги, оскільки|тому що| можливі запаморочення, особливо після|потім| прийому початкової дози препарату.
Індапамід
З|з| обережністю призначають при цукровому діабеті у стадії декомпенсації, гіперуриємії (особливо що супроводжуються|супроводяться| подагрою і уратним| нефролітіазом).
Хворим, які приймають серцев|сердечні| глікозиди, проносні засоби на фоні гіперальдостеронізму, а також |в,біля| особам|обличч,лиць| похилого віку показаний регулярний контроль вмісту|вмісту,утримання| іонів K+ і креатиніну.
На фон|на фоні| прийому індапаміду| слід систематично контролювати концентрацію іонів K+, Na+, Mg2+ у плазмі крові (можуть розвинутись електролітні порушення), pH, концентрацію глюкози, сечової кислоти і залишкового азоту.
Найбільш ретельний контроль показаний дл|я,біля| хворих на цироз печінки (особливо з|з| набряками або асцитом - ризик розвитку метаболічного алкалозу, що посилює прояви печінкової енцефалопатії), цукровину хворобу серця, із серцевою|сердечною| недостатністю, а також осіб|обличч,лиць| похилого віку. До групи підвищеного ризику також належать хворі із|з| збільшеним інтервалом QT на електрокардіограмі (уродженим|уроджу
Перше вимірювання|вимір| концентрації K+ у крові слід провести протягом першого тижня лікування.

на фон|на фоні| прийому індапаміду| може бути наслідком недіагностованого раніше гіперпаратиреозу.
У|в,біля| хворих на цукровий діабет потрібно контролювати рівень глюкози в крові, особливо за наявності гіпокаліємії.
Значна дегідратація може призвести до розвитку гострої ниркової недостатності (зниження клубочкової фільтрації). Хворим необхідно компенсувати втрату води і на початку лікування ретельно контролювати функцію нирок(бруньок|.
Індапамід може дати позитивний результат при проведенні допінг-контролю.
Хворим ві|з| артеріальну гіпертензію із гіпонатріємією| (внаслідок прийому діуретиків)необхідно за 3 дні до початку прийому інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (еналаприлу) припинити прийом діуретиків (індапаміду), прийом індапаміду відновлюють дещо пізніше або їм призначають початково низькі дози інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту.
Похідні сульфанаміди| можуть загострювати|загострять| перебіг системного червоного вовчака (це необхідно мати на увазі|внаслідок,унаслідок| при призначенні індапаміду|).
Ефективність і безпека у|в,біля| дітей не встановлені|установлена|.
Одночасне застосування еналаприлу і індапаміду зумовлює посилення їх антигіпертензивного ефекту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами.
Еналаприл|
Одночасне застосування еналаприлу| з|з| нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП)| може призвести до зниження гіпотензивного ефекту еналаприлу|. Застосування|вживання| разом з|з| калійзберігаючими| діуретиками (із спіронолактоном|, тріамтереном|, амілоридом|),а також з|з| калійвмісними препаратами підсилює|посилює| ризик гіперкаліємії, і|з| солями|соль| літію - до уповільнення виведення літію (показаний Еналаприл| і посилює дію лікарських засобів, що містять|утримують| теофілін.
Гіпотензивну дію еналаприлу| підсилюють|посилюють| діуретики, бета-адреноблокатори|, метилдопа|, нітрати, блокатори "повільних" кальцієвих каналів, гідралазин|, празозин|.
Імунодепресанти, алопуринол, цитостатики підсилюють|посилюють| гематотоксичність|. Препарати, що спричинюють|спричиняють| пригнічення функції кісткового мозку, підвищують ризик розвитку нейтропенії і|або агранулоцитозу|виходу|.

Індапамід
Салуретики, серцев|сердечні| глікозиди, глюко-| і мінералокортико|ди, тетракозактид,|, амфотерицин| В (внутрішньовенно), проносні засоби|кошти| підвищують ризик розвитку гіпокаліємії.
При одночасному прийомі з|з| серцевими|сердечними| глікозидами підвищується ймовірність|ймовірність| розвитку дигіталісної| інтоксикації; з|з| препаратами кальцію - гіперкальціємії|; з|з| метформіном| - можливе посилення ацидозу.
Підвищує концентрацію іонів літію в плазмі крові (зниження виведення з|з| сечею), літій спаралізує|робить,викликає,чинить,| нефротоксичну дію.
Астемізол, еритроміцин внутрішньовенно, пентамідин|, сультоприд|, терфенадин|, вінкамін|, антиаритмічні препарати Ia класу (хінідин, дизопірамід|) і III класу (аміодарон|, бретилію|м, соталол|) можуть призвести до розвитку аритмії за типом "пірует".
Нестероїдні протизапальні препарати, глюкокортикостероїди| засоби|кошти|, тетракозактид|, симпатоміметики знижують гіпотензивний ефект, баклофен| - підсилює|посилює|. Комбінація з|з| калійзберігаючими| діуретиками може бути корисною для|в,біля| деяких хворих, однак при цьому повністю не виключається можливість|спроможність| розвитку гіпо-| або гіперкаліємії, особливо у|в,біля| хворих на цукровий діабет і з нирковою
Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту збільшують ризик розвитку артеріальної гіпотензії і|або ниркової недостатності, особливо при наявному стенозі ниркової артерії.
Збільшує ризик розвитку порушень функції нирок(бруньок| при застосуванні йодовмісних контрастних засобів|кошти| у високих дозах (виведення організму). Перед застосуванням йодовмісних контрастних речовин хворим необхідно відновити втрату рідини. Іміпрамінові (трициклічні|) антидепресанти і антипсихотичні препарати підсилюють|посилюють| гіпотензивну дію і збільшують ризик розвитку ортостатичної гіпотензії.
Циклоспорин| підвищує ризик розвитку гіперкреатинемії|, гіперкаліємії |.
Знижує ефект непрямих антикоагулянтів (похідних кумарину| або індандіону|) через підвищення концентрації факторів згортання внаслідок зменшення об'єму|обсягу| циркулюючої крові і підвищення їх продукції печінкою (може знадобитися корекція дози).
Посилює блокаду нервово-м'язової передачі, що розвивається під дією неполізуючих
міорелаксантів.
Дає позитивну реакцію на допінг-контроль.

Умови та терміни зберігання. Зберігати при температурі 15 25 С у захищеному від вологи і недоступному для дітей місці.
Терміни придатності - 3 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. Комбіупаковка: таблетки еналаприлу малеату по 20 мг № 30 (10*3) і таблетки, вкриті оболонкою, індапаміду по 2,5 мг № 15 (5*3): по 10 таблеток і 5 таблеток, вкритих оболонкою - у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці.

Виробник. «Хемофарм» АД, Сербія.
Адреса. 26300, м. Вршац, Белградський шлях б/в,
тел./факс: 381/13/812345.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com