

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ТЕОБОН-ДИТІОМІКОЦИД

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: калію N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамат;
1 г мазі містить калію N-(1,1-діоксотіолан-3-іл)дитіокарбамату 50 мг;
допоміжна речовина: вазелін білий фармацевтичний.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або світло-жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника. Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України".

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування.

Код АТС D01A E.

Препарат чинить виражену фунгіцидну дію проти грибів *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Trichophyton rubrum*, *Microsporum canis* і бактерицидну дію відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Теобон-дитіомікоцид – малотоксичний препарат. Він не чинить канцерогенної, алергенної, мутагенної та тератогенної дії, не кумулюється в організмі. Препарат не чинить шкірно-резорбтивної дії і не надходить до системи кровоотоку.

Показання для застосування. Лікування і профілактика грибкових уражень шкіри.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат призначений лише для зовнішнього застосування. *Перед початком лікування порадьтеся з лікарем!*

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосовується з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини), яке визначає лікар.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не досліджувалася.

Діти. Не застосовують дітям через відсутність клінічного досвіду.

Спосіб застосування та дози. Мазь наносять тонким шаром на ушкоджену ділянку шкіри 1–2 рази на добу і ретельно втирають легкими рухами, захоплюючи невелику ділянку шкіри навколо осередку ураження. Ерозивні ділянки шкіри, що мокнуть, рекомендується перед застосуванням мазі підсушити марлевою серветкою. Ознаки поліпшення стану з'являються через 3–5 днів після початку лікування, курс лікування становить 12–14 днів.

Передозування. Дані щодо передозування препарату не встановлені.

Побічні ефекти. Теобон-дитіомікоцид у рекомендованих дозах не спричиняє ускладнень і побічних явищ. У хворих з полівалентною чутливістю можливе легке почервоніння шкіри, незначний свербіж. Ці явища мають тимчасовий характер і не вимагають зміни схеми лікування чи його припинення. Системних проявів, пов'язаних із резорбцією препарату, не встановлено.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не вивчалась.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. Мазь у тубах по 15 г. Кожна туба вміщена у пачку з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.