

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЦИНАРІКС
(CYNARIX®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: двояковипуклі, округлі, гладкі, блискучі таблетки жовто-зеленого кольору;

склад: діюча речовина: 1 таблетка містить: 55 мг екстракту артишоку, стандартизованого за вмістом кофеїлхінних кислот щонайменше 1,25%;
допоміжні речовини: мальтодекстрин, кальцію карбонат, целактоза, монтагліколевий віск, коповідон, кросповідон, еудражит, гліцерин, гуміарабік, гіметелоза, магнію стеарат, повідон, сахароза, кремнію діоксид, тальк, титану діоксид, барвник сиковіт зелений (E-104+E-132), барвник сиковіт хіноліновий жовтий (E-104).

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології.

Код АТС А05 АХ 10**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Стандартизований екстракт артишоку м'яко стимулює продукцію жовчі протягом довготривалого періоду, що запобігає застою жовчі в жовчовивідних шляхах і посилює секрецію панкреатичних ферментів.

Фармакокінетика. Період напіввиведення із сироватки компонентів артишоку становить 11 хвилин. Через 1 годину після введення екстракту артишоку спостерігається релевантне підвищення вироблення жовчної кислоти, що зберігається до трьох годин.

Показання для застосування. Невираzkова диспепсія, дискінезія жовчних шляхів, хронічний холецистит, хронічний гепатит, хронічна інтоксикація гепатотоксичними речовинами.

Спосіб застосування та дози. Внутрішньо дорослим і дітям старше 12 років по 1-2 таблетки 3 рази на добу під час або після прийому їжі; дітям від 6 до 11 років (які можуть ковтати таблетки) – по 1 таблетці 2 рази на добу. Термін лікування залежить від характеру та тяжкості захворювання і визначається лікарем індивідуально.

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні препарату у високих дозах можливий розвиток діареї.

Протипоказання. Підвищена чутливість до одного з інгредієнтів препарату; тяжкі порушення печінкової функції, оклюзія жовчовивідних шляхів, нагноєння (емпієма) жовчного міхура.

Передозування. Не спостерігалось.

Особливості застосування.

Застосування при вагітності та лактації.

Досвід застосування ЦИНАРІКСУ протягом багатьох років підтвердив відсутність тератогенного чи іншого негативного впливу на вагітність і лактацію. Не було виявлено жодного іншого ризику його застосування під час вагітності і лактації.

Вплив на здатність керувати автомобілем і механізмами.

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем або іншими механічними засобами. Не впливає на психофізичний стан і не викликає сонливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не виявлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці, при температурі не вище 30° С. Термін придатності препарату становить 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка.

24 таблетки: 2 блістери по 12 таблеток, упаковані в картонну коробку.

60 таблеток: 5 блістерів по 12 таблеток, упаковані в картонну коробку.

Виробник. Фармацевтичне Фабрік МОНТАВІТ ГмбХ., Австрія

Адреса. Зальбергштрассе 96, А-6060 Абзам, Тіроль, Австрія