

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВІРОГЕЛЬ
(VIRO GEL)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: interferon alfa-2b;

основні фізико-хімічні властивості: густа, желеподібна, однорідна маса білого або сіруватого кольору;

склад: 1 г мазі містить інтерферону альфа-2b рекомбінантного 10 000 МО;

допоміжні речовини: алюміній (у вигляді гідроксиду), полівініловий спирт, вода.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Імуностимулятори. Інтерферони. Код АТС L03A B05.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Інтерферон альфа-2b людський рекомбінантний виділяють з клітин Escherichia coli, в генетичний апарат яких вбудований ген людського лейкоцитарного інтерферону альфа-2b. Поліпептидна структура молекули, біологічна активність та фармакологічні властивості рекомбінантного білка та людського лейкоцитарного інтерферону альфа-2b ідентичні.

Вірогель – мазь інтерферону альфа-2b рекомбінантного на гідрогелевій основі – лікарський засіб для зовнішнього застосування, представлений сорбованим на гелі гідроксиду алюмінію інтерфероном альфа-2 рекомбінантним, отриманим з генетично модифікованого штаму-продуцента.

Інтерферон альфа-2b рекомбінантний, що входить до складу мазі, має широкий спектр протівірусної активності, бактеріостатичну та протизапальну дію.

Фармакокінетика. Товстий шар мазі ускладнює утворення захисної плівки. Поки плівка знаходиться на шкірі, відбувається вивільнення інтерферону і проникнення його в тканини.

Показання для застосування. Герпетичні ураження шкіри і слизових оболонок: простий і оперізуючий герпес, рецидивуючий герпес обличчя, генітальний герпес, герпетичний стоматит, гінгівіт. Профілактика грипу, гострих респіраторних вірусних захворювань.

Спосіб застосування та дози. При лікуванні герпетичних уражень мазь наноситься на уражені ділянки шкіри і слизових оболонок тонким шаром 2 рази на добу з інтервалом 12 год. Підсушується протягом 10 - 15 хв для утворення захисної плівки. Препарат слід наносити тонким шаром (наскільки це можливо). Кількість мазі об'ємом з сірникової головки достатньо для змазування поверхні розміром у п'ятикопійчиту монету (більше 4 кв.см.). Курс лікування становить від 5 до 7 днів (до повного зникнення порушень цілісності шкіряного покриву і слизових оболонок).

Для профілактики гострих респіраторних захворювань і грипу змазують маззю носові ходи 2 рази на добу. Тривалість застосування – весь період епідемії гострих респіраторних захворювань, але не більше одного місяця. Препарат рекомендується застосовувати при контакті з хворими на грип чи гострі респіраторні захворювання.

Побічна дія. Алергічні реакції.

Протипоказання. Протипоказаний особам, що страждають на алергічні захворювання в стадії загострення та мають індивідуальну непереносимість до інтерферонових препаратів, інших компонентів препарату.

Особливості застосування. При застосуванні мазі можливе легке відчуття стягування шкіри, обумовлене утворенням захисної плівки.

Мазь Вірогель при зберіганні може частково розшаруватися, а тому перед застосуванням її необхідно перемішати.

Вагітність і лактація.

Досвід застосування препарату у вагітних і жінок у період лактації відсутній, тому застосовувати з урахуванням ризик/користь.

Педіатрія.

Досвід застосування препарату у дітей відсутній. В дитячому віці препарат застосовувати з обережністю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Мазь Вірогель сумісна і добре комбінується з усіма лікарськими засобами, що застосовуються для лікування вищеперелічених захворювань.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від 0 С до +10°С. Термін придатності – 1 рік.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 2 г, по 3 г або по 5 г у скляних флаконах №1 у картонній упаковці.

Виробник. ЗАТ „Вектор-Медика”, Російська Федерація.

Адреса. Російська Федерація, 630559, Новосибірська область, с. Кольцово.