

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТЕНОТЕН
(TENOTEN)

Загальна характеристика :

основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою від білого до білого з кремуватим або сіруватим відтінком кольору; на плоскому боці з рискою нанесено напис MATERIA MEDICA, на другому плоскому боці нанесено напис TENOTEN;
склад: 1 таблетка містить антигіла до мозкоспецифічного білка S-100 афінноочищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 0,003 г;
допоміжні речовини: лактоза, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.

Форма випуску. Таблетки гомеопатичні.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат. Засоби, які впливають на нервову систему. Код АТС N07X X10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат виявляє анксиолітичну, антидепресивну, ноотропну, стрес-протекторну, антиастенічну, антиамнестичну, протигіпоксичну, нейропротекторну дію.

Модифікує функціональну активність білка S-100, який здійснює в мозку поєднання синаптичних (інформаційних) та метаболічних процесів. Здійснює ГАМК-міметичну та нейротрофічну дію, підвищує активність стреслімітуючих систем, сприяє відновленню процесів нейрональної пластичності.

Не викликає седативної, міорелаксантичної, холінолітичної дії.

В умовах інтоксикації, гіпоксії, при станах після гострого порушення мозкового кровообігу здійснює нейропротекторну дію, обмежує зону ушкодження, поліпшує процеси навчання та пам'яті.

Інгібує процеси перекисного окислення ліпідів.

Фармакокінетика. Не вивчена.

Показання для застосування. Невротичні та неврозоподібні розлади з проявами тривоги або тривожно-депресивною симптоматикою; астенічні стани.

Помірно виражені органічні порушення ЦНС, які супроводжуються нестійкістю емоційного фону, дратівливістю, апатією, зниженою активністю, зниженням пам'яті, вегетативними порушеннями.

Спосіб застосування та дози. На один прийом – 1 таблетку (тримати в роті до повного розчинення).

Залежно від тяжкості стану приймати 1-12 таблеток на добу:

від 1 таблетки вранці натще при легких неврозоподібних розладах до 6 прийомів до 2 таблеток при виражених тривожно-депресивних порушеннях.

Курс лікування – 1-3 місяці; за необхідності курс лікування можна продовжити до 6 місяців або повторити через 1-2 місяці.

Побічна дія. Не спостерігалася.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не встановлена безпека прийому препарату у пацієнтів молодше 18 років, в період вагітності та лактації.

Передозування. Випадки передозування не спостерігалися.

Особливості застосування. У зв'язку з наявністю в дії препарату активуючого компонента останній прийом здійснювати не пізніше, як за 2 години до сну.

При застосуванні препарату в період гострої алкогольної абстиненції можуть спостерігатися поодинокі випадки порушення акомодатії після першого прийому препарату, які мають короткочасний характер (не більше 30-40 хв) і не потребують відміни препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Випадків несумісності з іншими седативними засобами не виявлено.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C. Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упакування. По 20 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки в картонній коробці.

Виробник. ТОВ „НВФ „Матеріа Медика Холдинг”, Російська Федерація.

Адреса. 127473, Росія, м. Москва, 3-ій Самотечний пров., буд.9, тел/факс (095)684-43-33.