

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РЕСТРУКТА ПРО ІН'ЄКЦІОНЕ С
(RESTRUCTA PRO INJECTIONE S)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин без запаху;

склад: 2 мл містять: Colchicum autumnale D4 – 143 мг, Solidago virgaurea D3 – 83 мг, Berberis vulgaris D4 – 143 мг, Bryonia D4 – 143 мг, Calcium hypophosphorosum D3 – 83 мг, Convallaria majalis D4 – 83 мг, Echinacea D4 – 83 мг, Formica rufa D4 – 83 мг, Formica rufa D6 – 83 мг, Formica rufa D10 – 83 мг, Ferrum phosphoricum D10 – 83 мг, Lithium chloratum D3 – 83 мг, Toxicodendron quercifolium D4 – 146 мг, Smilax D4 – 143 мг, Salix alba D4 – 143 мг, Coffeinum monohydricum D4 – 83 мг, Cinchona pubescens D4 – 83 мг, Acidum silicicum D8 – 83 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат метаболічної, протизапальної, знеболювальної, протиревматичної, діуретичної, антисептичної дії. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Сечокислий діатез, подагра, сечокам'яний діатез, порушення пуринового обміну, артрити.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – 1 ампула по 2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних ін'єкцій, дітям – у вигляді „питних ампул” (розчинити разову дозу в 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті) 1-3 рази на тиждень.

Курс лікування – 4-6 тижнів.

Побічна дія. Препарат звичайно добре переноситься, але в рідких випадках, як наслідок індивідуальної чутливості до компонентів препарату Toxicodendron quercifolium (отруйного сумаху), Solidago virgaurea (золотої розги), можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, раптове зниження кров'яного тиску). В такому випадку прийом препарату треба тимчасово припинити до зникнення проявів алергічної реакції.

Протипоказання. Вагітність. Індивідуальна чутливість до компонентів препарату Toxicodendron quercifolium (отруйного сумаху), Solidago virgaurea (золотої розги).

Передозування. Не відмічалось.

Особливості застосування. З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування (пероральний прийом препарату: розчинити разову дозу в 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті, ін'єкції в акупунктурні точки).

Досвіду застосування препарату дітям до 6 років та жінкам, що годують груддю немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сумісний з іншими препаратами.

Умови та термін зберігання. Зберігати у зовнішній картонній пачці при температурі від 15°C до 25°C.

Зберігати в місцях, недоступних для дітей!

Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. 5 ампул по 2 мл у картонній пачці.

Виробник. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.