

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ПРОКТОЗОЛ
(PROCTOZOL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: супозиторії жовто-зеленого кольору, сигароподібної форми; допускається наявність нальоту на поверхні супозиторію;

склад: 1 супозиторій містить буфксамаку 0,25 г, вісмуту субгалату 0,1 г, лідокаїну гідрохлориду 0,01 г;

допоміжні речовини: титану діоксид, жир твердий.

Форма випуску. Супозиторії ректальні.

Фармакотерапевтична група. Антигемороїдальні препарати для місцевого застосування. Код АТС С05А Х03.

Фармакологічні властивості. Протизапальний, аналгетичний, ранозагоюючий засіб для місцевого лікування запальних захворювань аноректальної ділянки. Буфксамак виявляє протизапальну дію, зумовлену пригніченням синтезу простагландинів. Вісмуту субгалат виявляє в'язучу та підсушуючу дію, сприяє загоєнню ран. Лідокаїн виявляє місцевоанестезуючу дію, блокуючи генерацію і проведення нервового імпульсу.

Показання для застосування. Геморой 1–2-го ступеня тяжкості, тріщини заднього проходу, гостра і хронічна екзема анального отвору, запальні процеси в ділянці прямої кишки (у т. ч. проктит).

Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають по 1 супозиторію 2 рази на день, бажано після спорожнення кишечника. Після поліпшення стану – по 1 супозиторію на день.

Тривалість лікування встановлюється індивідуально. Рекоменується продовження застосування препарату протягом 8–10 днів після купірування гострої фази захворювання.

Побічна дія. Місцеві алергічні реакції в періанальній області: печіння, свербіж, набряк, почервоніння та лущення шкіри.

Протипоказання. Специфічні запальні процеси (у т. ч. сифіліс, туберкульоз), вік до 18 років, вагітність, лактація, підвищена чутливість до компонентів препарату.

Передозування. При перевищенні рекомендованих доз можливо підсилення симптомів, що описані у розділі “Побічна дія”.

Лікування: відміна препарату, симптоматична терапія.

Особливості застосування. Не рекомендується тривале (більше 14 днів) застосування препарату. За необхідності тривалого лікування слід застосовувати препарати, що не містять місцевого анестетика.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. На даний час взаємодії препарату з іншими лікарськими препаратами не виявлено.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі

8–15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 5 супозиторіїв у контурній чарунковій упаковці.

Виробник. ЗАТ «Лекхім-Харків».

Адреса. Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.