

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РЕДУКТАН
(REDUKTAN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: суміш однорідно подрібнених частин рослин з ароматним запахом, до складу якої входять чорно-коричневі і коричнево-зелені рогові частини, деякі вкриті білим нальотом (*Fucus*), частини сіро-коричневої кори оранжево-коричневої на внутрішньому боці (*Frangulae cortex*), світло-жовті квітки (*Sambuci nigrae flos*), частини сіро-коричневих або жовто-зелених тонких листів (*Sennae folium*), сіро-коричневі частини насіння з поздовжніми жолобками (*Foeniculi amari fructus*), залишки пожовтілих білих коренів (*Petroselinii radix*), частини чорно-фіалкових кісточок (*Sambuci fructus*), частини зелених з рудими крапками листів (*Betulae folium*), залишки жовтих коренів з коричневою шкірочкою (*Liquiritiae radix*).

склад: 15% фукусу (бурих водоростей) пухирчастого (*Fucus*), 15% кори крушини (*Frangulae cortex*), 15% квіток бузини чорної (*Sambuci nigrae flos*), 10% листя сени (*Sennae folium*), 10% плодів фенхелю (*Foeniculi amari fructus*), 10% кореня петрушки (*Petroselinii radix*), 10% плодів бузини чорної (*Sambuci fructus*), 10% листя берези (*Betulae folium*), 5% кореня солодки (*Liquiritiae radix*).

Форма випуску. Збір.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код АТС А16АХ10**.

Фармакологічні властивості. Комбінований препарат з лікарської рослинної сировини.
Виявляє проносну дію, стимулює сечоутворення та сечовиділення.

Показання для застосування.

У складі комбінованої терапії при запорах, затримці рідини в організмі, ожирінні (особливо ускладненому запорами).

Спосіб застосування та дози. Для дорослих 1 фільтр-пакет або 1 столову ложку (5 г) збору заливають 250 мл окропу, настоюють 5 хв/15 хв відповідно у закритому посуді. Не кип'ятити. Потім проціджують. Приймають теплим перед їжею без додавання цукру 1-3 рази на добу. Вживати безпосередньо після приготування.
Курс лікування становить 2-4 тижні.

Побічна дія. У хворих з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції на будь-який компонент збору. У разі виникнення яких-небудь незвичайних реакцій необхідно припинити приймати препарат.

Протипоказання. Вагітність, годування груддю. Набряки, спричинені серцевою й нирковою недостатністю. Досвід застосування у дітей відсутній.

Передозування. Передозування або неправильне застосування може призвести до порушення рівноваги електролітів і втрати калію. Терапія симптоматична.

Особливості застосування. Невідомі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25° С, в оригінальній упаковці.

Термін придатності - 3 роки

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 г у пакетах, вкладених в коробку; по 2 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у коробці.

Виробник. ЛЕРОС с.р.о. Чеська Республіка.
LÉROŠ s.r.o. Česká Republika.

Адреса. Біля Народної галереї 470, 156 15 Прага 5, Чеська Республіка.
U Národní galerie 470, 156 15, Praha 5, Česká Republika.