

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ІНГАЛІН
(INHALIN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-бурого кольору, зі своєрідним запахом;

склад: 100 мл рідини містять ментолу натурального (левоментолу) або ментолу рацемічного 0,71 г, евкаліпта настойки 35,7 мл;

допоміжні речовини: спирт етиловий 96%, гліцерин.

Форма випуску. Рідина для інгаляції.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A10.

Фармакологічні властивості. Проявляє антисептичну активність (зумовлену окислювальними властивостями терпенового компонента ефірної олії евкаліпта настойки), має протизапальну, відхаркувальну та незначну обезболювальну дію (ментол).

Показання для застосування. Гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів: фарингіти, трахеїти, бронхіти, пневмонія.

Спосіб застосування та дози. Для інгаляцій дорослим призначають по 10 – 20 крапель Інгаліну на склянку (200 мл) теплої води, а дітям віком старше 3 років – по 5 –10 крапель. Інгаляції рекомендується проводити 3 – 4 рази на день. Тривалість курсу лікування залежить від його ефекту. Інгалін використовують із застосуванням тепловологого інгаляційного пристрою.

Побічна дія. Препарат звичайно добре переноситься, але можуть виникнути ознаки алергії у вигляді висипання на шкірі, свербіж, іноді контактний дерматит (у ділянці губ).

Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років.

Передозування. Передозування препарату може спричинити алергічні реакції. У таких випадках зменшують дозу або припиняють прийом. Терапія симптоматична.

Особливості застосування. Інгалін використовують із застосуванням тепловологого інгалятора. Для жінок у стані вагітності та жінок, які годують груддю, доцільність застосування препарату вирішує лікар. Вплив на здатність керувати транспортними засобами та потенційно небезпечними механізмами не відзначався. В процесі зберігання Інгаліну допускається випадання осаду, тому перед його застосуванням вміст флакона необхідно збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. На даний час взаємодія Інгаліну з іншими лікарськими препаратами не виявлена.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С. *Зберігати у недоступному для дітей місці.*

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 40 мл у флаконі або флаконі полімерному.

Виробник. ВАТ "Тернофарм"

Адреса. 46010, Україна, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
тел./факс (0352) 521-444, E-mail: zbut@ternopharm.com.ua