

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕНТЕРОСГЕЛЬ ІЗ СОЛОДКИМ СМАККОМ
(ENTERO SGELUM DULCIS)

Склад лікарського засобу.

діюча речовина: гідрогель метилкремніової кислоти 69,9 г/100 г;
допоможні речовини: підсоложувачі Е 954, Е 952, вода очищена.

Лікарська форма. Паста для перорального застосування.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ “Еколоохоронна фірма “КРЕОМА-ФАРМ”.
03680, м. Київ, вул. Радищева, 3.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Код АТС A07B C10.

Фармакологічні властивості. При прийманні внутрішньо чинить детоксикаційну дію. Препарат ефективно адсорбує із вмісту кишечнику та з крові (через мембрани капілярів ворсинок слизової оболонки кишечнику) середньомолекулярні токсичні речовини, продукти незавершеного метаболізму, сприяє виведенню інкорпорованих радіонуклідів. Ентеросгель усуває прояви токсикозу, покращує функцію кишечнику, печінки, нирок, нормалізує показники крові та сечі. Як ефективний детоксикант Ентеросгель сприяє підвищенню імунітету.

Препарат обволікає слизову оболонку шлунка та кишечнику, захищає її від ерозивних процесів. Не всмоктується з кишечнику.

Показання для застосування. Дезінтоксикація організму при хронічній нирковій недостатності, спричиненій піелонефритом, полікістозом нирок, нефролітіазом; при токсичному гепатиті, вірусному гепатиті А і В, гепатохолецистіті, цирозі печінки та холестазі різної етіології, гастритах зі зниженою кислотністю, ентероколітах, колітах, діареї;

при отруєнні алкоголем і наркотичними засобами; алергічних реакціях, шкірних захворюваннях (діатези, нейродерміти); при опіковій хворобі; гнійно-септичних процесах;

токсикозах першої половини vagітності; у комплексній терапії дисбіозу кишечнику.

Протипоказання. Гостра кишкова непрохідність. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат слід приймати згідно з рекомендаціями, викладеними в цій інструкції.

Особливі застереження.

Препарат не містить цукру.

Застосування у період vagітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати при vagітності та в період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують новонародженим. Дітям віком до 2 років перед застосуванням разову дозу препарату можна змішувати з невеликою кількістю води.

Способ застосування та дози. Приймають внутрішньо 2-3 рази на добу за 1,5 – 2 години до або через 2 години після їди або застосування інших медикаментів, запиваючи достатньою кількістю води. Для дорослих та дітей старше 14 років разова доза препарату становить 15 г (столова ложка), добова – 45 г. Для дітей від народження до 3 років разова доза препарату становить 5 г (чайна ложка), добова – 10 г; від 3 до 5 років разова доза - 5 г, добова – 15 г; від 5 до 14 років - разова доза – 10 г (десертна ложка), добова – 30 г.

Курс лікування – від 7 до 14 діб. При тяжких формах захворювань протягом перших трьох діб застосовують подвійну разову дозу, а при хронічному перебігу хвороби (хронічна ниркова недостатність, цироз печінки) можливе більш тривале застосування препарату.

Передозування. Не описане.

Побічні ефекти. При перших прийомах препарату можливий короткочасний запор. Для його запобігання людям, скильним до запору, в перші два дні застосування препарату рекомендується очищувальна клізма на ніч.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. За умови дотримання способу застосування (Ентеросгель і інші медикаменти приймаються роздільно в часі), препарат можна застосовувати в комплексній терапії з іншими лікарськими і профілактичними засобами, в тому числі з пробіотиками, фітопрепаратами, адаптогенами, імуномодуляторами.

Термін придатності. 1 рік.

Умови зберігання. Зберігати при температурі 15 - 25 °C в недоступному для дітей місці. Після розкриття упаковки зберігати при тих же умовах в щільно закритій тарі.

Упаковка. По 135 г, 225 г, 270 г, 405 г, 450 г у контейнерах пластикових.

Категорія відпуску. Без рецепта.