

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СУДОКРЕМ
(SUDOCREM®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: білий, гомогенний крем, без видимих домішок з запахом лаванди;

склад: 1 г крему містить:

цинку оксид 15,25%, бензиловий спирт 0,39%, бензил бензоат 1,01%, бензил цинамат 0,15 %;

допоміжні речовини: ланолін (гіпоалергенний), вода очищена, натрію бензоат, парафін, віск бджолиний синтетичний, віск мікрокристалічний, сорбітан сесквіолеат, пропіленгліколь, ліналіл ацетат, ароматизатор лаванди, рідкий парафін, антиоксидант, який містить пропіленгліколь 60%, лимонну кислоту 20%, бутилірований гідроксіанізол (Е 320) 20%.

Форма випуску. Крем для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшуючою та захисною дією. Препарати цинку. Код АТС D02A B01.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Цинку оксид має антисептичну, в'яжучу, протизапальну дію. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та заживлює незначні опіки, неглибокі рани.

Бензиловий спирт має місцеву анестезуючу дію з дезінфекційними властивостями.

Бензил бензоат має антисептичну дію, а також діє як розчинна речовина.

Бензил цинамат є синтезованою речовиною з бензилового спирту та коричної кислоти, який має антибактеріальну та протигрибкову дію.

Фармакокінетика. Препарат використовується місцево, тому дослідження абсорбції не проводилось.

Показання для застосування. Для місцевого лікування:

- пелюшкового висипу;
- пролежнів;
 - поверхневих ран;
 - акне;
 - відмороження I ступеня;
 - дерматозів різної етіології (екземи, крім стадій ексудативних проявів, сонячної еритеми);
 - попрілостей, незначних термічних опіків;
 - мацерацій або подразнень шкіри, пов'язаних з нетриманням сечі.

Спосіб застосування та дози. Тільки для зовнішнього застосування.

Якщо не призначено інакше, застосовують 4 - 6 разів на день. Наносять на шкіру тонким шаром, у місцях де це необхідно.

Призначають для дорослих, дітей та немовлят. Немає різниці при застосуванні у залежності від віку.

Тривалість лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання.

Побічна дія. Не описана. Препарат звичайно добре переноситься, рідко може викликати алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Передозування. Не описано. При місцевому застосуванні передозування малоімовірно.

Особливості застосування. Використовувати тільки для зовнішнього застосування. Не допускати контакту з очима та слизовими оболонками.

При потрапленні в очі та слизові оболонки промити їх водою.

Вагітність та лактація.

Протипоказань немає.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та роботи з механізмами.

Не встановлений.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі до 25 °С, у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 60 г, або 125 г, або 250 г у поліпропіленовій баночці з кришкою, яка зберігає цілісність упаковки; або по 15 г у поліпропіленовій баночці з блістер - кард.

Виробник. Форест Тосара Лімітед, Ірландія/ Forest Tosara Limited, Ireland.

Адреса. Юніт 146, Белдойл Індастріел Істейт, Грендж Роуд, Дублін, 13/ Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13