

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЦЕТРАСЕПТ З ІСЛАНДСЬКИМ МОХОМ**  
**(CETRASEPT WITH ICELAND MOSS)**

**Загальна характеристика:**

**Фізико-хімічні властивості:** кругла таблетка від сіруватого до світло-сіро-зеленого кольору або світло-сіро-коричневого, зі смаком і характерним запахом рослинних екстрактів, евкаліптової олії і ментолу;

**Склад:** 1 таблетка містить

екстракту ісландського моху	30 мг,
аскорбінової кислоти	30 мг,
гідрохлориду пипіридину	1,5 мг,
ментолу	5 мг,
ефірної олії	0,5 мг;

**Додаткові речовини:** сорбітол, кремнію діоксид колоїдний, гідроксипропілметилцелюлоза, магнію стеарат.

**Форма випуску.** Таблетки.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС АТХ R05X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Антисептичний, протизапальний, відхаркувальний і злегка знеболювальний засіб.

Аскорбінової кислоти ісландського моху мають пом'якшувальну, відхаркувальну, бактеріостатичну дію. Імуностимулююча дія екстрактів сприяє більш швидкому одужанню при захворюваннях дихальних шляхів.

Ісландський мох містить велику кількість слизових речовин, які справляють обволікаючу дію, пом'якшують подразнення і зменшують запалення слизових оболонок порожнини носа, гортані і верхніх дихальних шляхів.

Ціально підібраний засіб – хлорид пипіридину – знищує збудників інфекції. Ефірна олія евкаліпта і ментол також мають антисептичну дію. Вітамін С (аскорбінова кислота) лідирує захисні сили організму на боротьбу з інфекцією, а також нормалізує проникність капілярів, яка часто буває порушеною при запальних процесах.

**Фармакокінетика.** Не досліджена.

**Показання для застосування.**

Запалення гортані і верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються болями в горлі, захриплістю, сухим подразливим кашлем: фарингіт, ларингіт, бронхіт.

**Спосіб застосування та дози.**

Необхідно розсмоктувати в порожнині рота.

Дітям – по 1 таблетці кожні 2-3 години (максимальна добова доза - 6 - 8 таблеток);

дорослим – по 1 таблетці кожні 3 - 4 години (максимальна добова

доза - 4- 5 таблеток);

дітям від 5 до 10 років – по ¼ - ½ таблетки кожні 3 - 4 години (максимальна добова

доза - 2- 3 таблетки).

При розсмоктуванні таблетки для кращого її впливу рекомендується протягом ½ години утримуватися від пиття і приймання їжі.

**Протипоказання.**

Гострі реакції.

**Протипоказання.**

Знижена чутливість до компонентів препарату.

Вік до 5 років.

**Спосіб застосування.**

Відомо.

**Протипоказання.**

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем або потенційно небезпечними механізмами.

Протипоказаний для застосування препарату в період вагітності та лактації немає.

Протипоказано застосовувати при бронхіальній астмі.

**Сумісність з іншими лікарськими засобами.**

Не виявлена.

**Умови зберігання.**

Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності – 3 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Пакетна форма.** 8 таблеток у блістері; по 2 блістери в коробці.

**Виробник.** Др. Мюллер Фарма.

**Адреса.** Поухов 182  
 503 41 Градец Кралове  
 Чеська Республіка.