

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КРУШИНИ СИРОП
(SIRUPUS FRANGULAE)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: темно-коричнева густа рідина зі специфічним запахом. У процесі зберігання допускається утворення осаду;

склад: 100 мл сиропу містять 65 мл екстракту кори крушини (0,83:1);

допоміжні речовини: цукор.

Форма випуску. Сироп.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А В07.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Крушина вільховидна – лікарська рослина. Для медичних цілей використовують кору, яка містить антраглікозиди, франгулін, глікофрангулін, франгулаемодин, хризофанову кислоту (вміст похідних антрацену – не менше 4,5%), а також дубильні речовини, сапоніни, органічні кислоти, ефірну олію, цукри, алкалоїди та ін. Володіє специфічним м'яко діючим проносним ефектом. Основні діючі речовини – емодин і хризофанова кислота – утворюються в товстому кишечнику і, подразнюючи його інтерорецептори, підсилюють перистальтику та прискорюють спорожнення кишечника. При цьому сповільнюється всмоктування рідини з товстого кишечника, що зумовлює розрідження калових мас зі збільшенням їх об'єму, що сприяє послаблюючому ефекту антраглікозидів. Препарат не впливає на перистальтику тонкого кишечника. Проносний ефект препарату розвивається повільно і звичайно настає через 8–12 год після прийому.

Показання для застосування. Хронічний запор, атонія кишечника.

Спосіб застосування та дози. Призначають внутрішньо перед сном. Перед застосуванням збовтати.

Дорослим призначають по 1–2 чайні ложки. Дітям віком від 5 до 12 років призначають по ½ чайної ложки, від 12 років і старше – по 1 чайній ложці.

Побічна дія. Диспептичні явища, болі в животі, алергічні реакції.

Протипоказання. Дитячий вік до 5 років, вагітність. З обережністю призначають матерям, які годують груддю, хворим на цукровий діабет та хворим з паренхіматозними ураженням нирок і печінки.

Передозування. *Симптоми:* колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту.

Лікування: припинення прийому препарату. Специфічного антидоту немає.

Особливості застосування. При тривалому призначенні препарату розвивається звикання, внаслідок чого необхідно збільшувати його дозу.

Перед призначенням препарату необхідно встановити генез порушень функції кишечника.

Одна чайна ложка сиропу (5 мл) містить 3,25 г цукру (відповідає 0,27 ХО), це необхідно враховувати при призначенні препарату хворим на цукровий діабет.

Взаємодія з лікарськими засобами. Дані відсутні.

Умови та термін зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі від 15 °С до 25 °С. При зберіганні допускається утворення осаду.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл або по 100 мл у флаконах.

Виробник. ВАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод».

Адреса. Україна, 91019, м. Луганськ, вул. Кірова, 17.