

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЛОРОФІЛІПТ
(CHLOROPHYLLIPT)

Загальна характеристика:

основні фізико - хімічні властивості : рідина темно-зеленого кольору;

склад: 100 мл розчину містять хлорофіліпту екстракту густого 1 г;

допоміжні речовини: спирт етиловий 96%.

Форма випуску. Розчин спиртовий.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні і дезінфікуючі засоби. Код АТС D08AX10**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат має антибактеріальну активність відносно стафілококів, у тому числі антибіотикостійких штамів.

Фармакокінетика. Не вивчена.

Показання для застосування. Лікування захворювань, що спричинені антибіотикостійкими штамми стафілококів, опікова хвороба, трофічні виразки і виразки кінцівок, що довго загоюються, у комплексному лікуванні післяопераційних, післяпологових та іншого походження септичних станів, при лікуванні стафілококових дисбіозів кишечника і санації стафілококових носійств, ерозіях шийки матки .

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям віком від 12 років препарат призначають внутрішньо, місцево, у клізмах.

Внутрішньо Хлорофіліпт застосовують при носійстві стафілококів у кишечнику та для профілактики післяопераційних ускладнень. Дорослі приймають по 5 мл 1% спиртового розчину, розведеного 30 мл води 3 рази на добу за 40 хвилин до прийому їжі.

При носійстві стафілококів у кишечнику Хлорофіліпт призначають також у клізмі (по 20 мл 1% розчину розводять у 1 л води – це доза для однієї клізми). Процедуру проводять 1 раз на добу. Клізму з препаратом ставлять через кожні два дні.

Курс лікування складається з 10 процедур.

Для місцевого застосування (лікування опіків і трофічних виразок) 1% розчин розводять 1: 5 0,25% розчину новокаїну. При лікуванні ерозії шийки матки попередньо осушують

тампоном усі складки слизової оболонки піхви і піхвової частини шийки матки і змазують 1% розчином Хлорофіліпту канал шийки матки.

Для спринцювання піхви 15 мл 1% спиртового розчину розводять в 1 л води.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та визначає лікар.

Побічна дія. Можлива поява алергічних реакцій (набряклість губ, слизової оболонки рота).

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату, дитячий вік до 12 років (для внутрішнього та інтравагінального застосування). Вагітність та лактація

Передозування. Випадки передозування не описані.

Особливості застосування. До лікування визначають чутливість хворого до Хлорофіліпту, для чого хворий випиває 25 крапель препарату, розчиненого в 1 столовій ложці води. При відсутності через 6-8 годин ознак алергічної реакції (набряклість губ, слизової оболонки носа, зів) та інших алергічних проявів, препарат можна застосовувати.

Досвід застосування у дітей до 12 років відсутній.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Поки що невідома.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 20°C.

Термін зберігання - 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 100 мл у флаконі скляному або банці, що вкладені у пачку.

Виробник. АТ "Галичфарм".

Адреса. 79024, Україна, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.