

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ФІТОЛІЗИН ПЛЮС**  
(Phytolysin Plus)

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** однорідна маса м'якої консистенції, від жовто-коричневого до зеленувато-коричневого кольору, зі специфічним ароматним запахом;

**склад:** 100 г пасти містять фітоекстракту густого (вміст сухого залишку 65 %) - 12 г, олії шавлії - 1 г, м'яти олії - 0,5 г, олії сосни гірської - 0,2 г;

**допоміжні речовини:** етилпарагідроксibenзоат, агар-агар в перерахуванні на 100 % суху речовину, крохмаль пшеничний, гліцерин, олія апельсинова, ванілін, вода очищена.

**Форма випуску.** Паста.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що сприяють розчиненню сечових конкрементів.

Код АТС G04B C.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Комбінований препарат рослинного походження. Виявляє протизапальну, сечогінну, спазмолітичну та антимікробну дію. Сечогінна дія зумовлена похідними флавону, інозитом, сапонінами та силікатами. Останні також посилюють виведення сечової кислоти при уратних відкладеннях у нирках. Антимікробна дія (бактерицидна та бактеріостатична) та протизапальний ефект обумовлюють компоненти лікарських рослин та ефірних олій. Препарат перешкоджає утворенню сечового "піску" та ниркових конкрементів.

**Показання для застосування.** Хронічний піелонефрит, хронічний цистит, хронічний простатит, хронічний уретрит, профілактика сечокам'яної хвороби.

**Спосіб застосування та дози.** Внутрішньо, після їжи, дорослим розчинити 1 чайну ложку пасти у 100 мл (1/2 склянки) теплої підсолодженої кип'яченої води. Призначають по 1 чайній ложці Фітолізину (пасти) 3 - 4 рази на добу.

Курс лікування – від 2 тижнів до 1,5 місяців (залежно від характеру захворювання та ефективності лікування). При необхідності курс лікування повторити.

**Побічна дія.** Можливі алергічні реакції, в окремих випадках можлива нудота.

**Протипоказання.** Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, гострі нефрити, гломерулонефрит, нефрози, фосфатний літіаз, гастрит, гепатит, панкреатит, жовчокам'яна хвороба (у т. ч. обструктивні форми), вагітність, годування груддю, вік до 15 років.

**Передозування.** Про випадки передозування пасти Фітолізин не повідомлялося.

**Особливості застосування.** При лікуванні Фітолізином слід припинити годування дитини груддю, у зв'язку з відсутністю даних про безпеку.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не вивчалася.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати в недоступному для дітей, сухому місці при температурі від 15<sup>0</sup>С до 25<sup>0</sup>С.

Термін придатності – 3 роки.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 100 г у тубах алюмінієвих, вкладених в пачку.

**Виробник.** ВАТ "Фармак".

**Адреса.** Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.