

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**Кутасепт® Ф**  
**(Cutasept® F)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту, густина – приблизно 0,88 г/см<sup>3</sup>, рН – майже 8,5;

**склад:** 100 г розчину містять: 2-пропанолу – 63 г, бензалконію хлориду – 25 мг;

**допоміжні речовини:** вода очищена.

**Форма випуску.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТС D08A X53.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Препарат має пролонговану бактерицидну (у т. ч. по відношенню до MRSA/ЕНЕС<sup>1)</sup> та інших антибіотикорезистентних бактерій), фунгіцидну, туберкулоцидну дію. Інактивує віруси гепатиту В, ВІЛ, герпесу типу 1, ротавіруси та ін.

Спиртова складова препарату одночасно зі швидким ефектом антимікробної дії забезпечує знежирювальне очищення шкіри, а також проникнення бензалконію хлориду у глибокі шари шкіри, за рахунок чого забезпечується пролонгована дія препарату.

Кутасепт® Ф сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки після висихання засобу.

*Фармакокінетика.* Дані відсутні.

**Показання для застосування.** Перед- та післяопераційна обробка шкіри та операційних швів, антисептична обробка шкіри перед ін'єкціями, забиранням крові, пункціями, дрібними хірургічними втручаннями, а також при дрібних травмах та інфекціях шкіри бактеріальної та грибової етіології. Гігієнічна та хірургічна обробка шкіри рук.

**Спосіб застосування та дози.**

Кутасепт® Ф – готовий розчин для зовнішнього застосування. Місце дії повинно бути зволожено препаратом.

Антисептична обробка та очищення шкіри перед ін'єкціями:

- стерильним тампоном, змоченим Кутасептом® Ф, або методом розпилення, рясно зволожити місце ін'єкції та протерти ділянку шкіри стерильним тампоном.

Антисептична обробка шкіри при знятті швів та перев'язувальних матеріалів:

- перед зняттям операційних швів рясно зволожити шов та прилеглу ділянку шкіри стерильним тампоном, просоченим препаратом;
- після видалення шовного матеріалу знову рясно змочити препаратом Кутасепт® Ф та очистити стерильним тампоном ділянку шва. Накласти стерильну пов'язку.

Підготовка шкіри для внутрішньосуглобової ін'єкції, канюлювання, артроскопії та пункції:

- рясно зволожити ділянку шкіри препаратом Кутасепт® Ф за допомогою вологого тампона або методом розпилення, витримати час експозиції та очистити шкіру стерильним тампоном спрямованими рухами.

---


1) MRSA - мультирезистентний золотистий стафілокок (*Staphylococcus aureus*);  
ЕНЕС - ентерогеморагічна кишкова паличка (*Escherichia coli*).

**Передопераційна обробка шкіри:**

- обробити операційне поле за допомогою стерильного тампона, просоченого препаратом. Тампон застосовувати 2 – 3 рази, потім замінити. Спочатку провести антисептичну обробку місця запланованого розтину шкіри, а потім прилеглу ділянку шкіри. Хірургічну плівку накладати тільки після висихання шкіри.

**Післяопераційна обробка шкіри:**

- після закриття рани видалити хірургічну плівку;
- шов та прилеглу ділянку шкіри очистити стерильним тампоном, просоченим препаратом Кутасепт® Ф. Стерильну пов'язку накласти на зволожену препаратом ділянку шкіри.

	Застосування на шкірі з малою кількістю сальних залоз <sup>1)</sup> :	мін. 15 с мін. 1 хв.
	– перед пункціями та ін'єкціями	
	– перед пункціями суглобів, порожнин тіла, порожнистих органів, при операційних втручаннях	
	Застосування на шкірі з великою кількістю сальних залоз <sup>1)</sup>	мін. 10 хв.
	– перед будь-якими втручаннями	
	Гігієнічна антисептична обробка рук	3 мл – втирати протягом 30 с
	Хірургічна антисептична обробка рук	2 x 5 мл – втирати протягом 5 хв.
	Профілактика інфекцій, що викликаються:	
	ротавірусами	15 с
	ВІЛ	30 с
вірусами герпесу типу 1	30 с	
вірусами гепатиту В <sup>2)</sup>	3 хв.	
MRSA / EHEC	1 хв.	
Для поверхонь долоней діють рекомендації з антисептичної обробки рук.		

- шкіра з малою кількістю сальних залоз (100 залоз / см<sup>2</sup>).

- шкіра з великою кількістю сальних залоз (400-900 залоз/см<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Рекомендації Німецького товариства гігієни та мікробіології (DGHM). <sup>2)</sup> Антигентест.

**Побічна дія.** Не встановлена.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Передозування.** Не встановлене.

**Особливості застосування.** Не застосовувати для антисептики слизових оболонок, не допускати контакту зі слизовими оболонками очей. Для дозування препарату використовуються спеціальні дозатори та розпилювачі. Електричними приладами користуватися тільки після повного висихання шкіри. Хірургічну плівку накладати тільки після повного висихання шкіри.

Не використовувати поблизу джерел займання.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не встановлена.

**Умови та термін зберігання.** Займистий. Дотримуватись правил техніки безпеки при роботі зі

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України  
спиртовмісними засобами. Зберігати при температурі не вище +25°C в недоступних для дітей місцях!

Термін придатності – 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** Пластиковий флакон по 50 мл з розпилювачем, пластиковий флакон по 250 мл з розпилювачем, пластиковий флакон по 1 л, пластикова канистра по 5 л.

**Виробник.** BODE Chemie GmbH & Co.

**Адреса.** Melanchtonstr. 27  
22525 Hamburg, Germany  
Tel. (+49-40) 5 40 06-0