

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕПТОЦИД
(STREPTOCID)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: sulfanilamide; пара-Амінобензолсульфамід;

основні фізико-хімічні властивості: лінімент білого з жовтуватим або з жовтувато-буруватим відтінком кольору, зі специфічним запахом;

склад: 10 г лініменту містять стрептоциду 0,5 г;

допоміжні речовини: риб'ячий жир очищений для зовнішнього застосування, бутилгідроксіанізол, емульгатор №1, твін-80 (поліоксіетиленсорбітанмоноолеат) або натрій карбоксиметилцелюлоза очищена, вода очищена.

Форма випуску. Лінімент.

Фармакотерапевтична група. Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід. Код АТС D06B A06**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Стрептоцид, лінімент 5% володіє протимікробною дією відносно стрептококів, пневмококів, кишкової палички та деяких інших бактерій.

Фармакокінетика. Ступінь системної дії після застосування препарату на шкіру невідома.

Показання для застосування. Місцеве лікування інфікованих ран, опіків I та II ступеня, фурункулів, карбункулів, поверхневих піодермій, поверхневого запалення шкіри, що характеризується виникненням гнійничків, які засихають з утворенням кірки, бешихи.

Спосіб застосування та дози. Препарат наносять тонким шаром безпосередньо на уражену поверхню або на марлеву серветку, яку накладають на попередньо оброблену 3 % розчином перекису водню уражену ділянку 1-2 рази на день. Перев'язки здійснюють через 1-2 дні. Кількість аплікацій на добу, тривалість застосування корегують залежно від характеру захворювання та досягнутого терапевтичного ефекту.

Побічна дія. Дерматити, алергічні реакції у вигляді кропив'янки.

Протипоказання. Гіперчутливість до сульфаніламідів.

Передозування. При передозуванні можуть підсилюватися побічні дії препарату. Терапія – симптоматична.

Особливості застосування. Вагітні та жінки у період лактації застосовують препарат з обережністю і тільки тоді, коли, на думку лікаря, користь від застосування препарату буде перевищувати можливий ризик розвитку негативної дії на плід (дитину). Дітям до 6 років призначають з обережністю.

Не допускається попадання лініменту в очі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Новокаїн, який містить залишок пара-Амінобензойної кислоти, знижує ефективність препарату, якщо препарати були застосовані відразу один за одним або одночасно.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці при температурі від 8 °С до 15 °С; не допускається заморожування. *Зберігати в недоступному для дітей місці!* Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування. Не застосовувати препарат після закінчення вказаного терміну придатності.

Термін придатності - 2 роки

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г в туби алюмінієві.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, м. Лубни, Полтавська обл., вул. Петровського, 16.