

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕПТОЦИД
(STREPTOCID)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: sulfanilamide; параамінобензолсульфамід;

основні фізико-хімічні властивості: однорідна густа маса білого або світло-жовтого кольору;

склад: 1 г мазі містить стрептоциду 0,1 г;

допоміжні речовини: вазелін білий, масло вазелінове.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід. Код АТС D06B A06**.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Стрептоцид (п-амінобензолсульфамід), як і інші сульфаніламід, порушує утворення в мікроорганізмах так званих факторів росту – фолієвої, дегідрофолієвої кислот, інших сполук, що містять у своїй молекулі параамінобензойну кислоту. Через близькість хімічної структури параамінобензойної кислоти до хімічної структури стрептоциду, останній як конкурентний антагоніст кислоти включається в метаболізм мікроорганізмів і порушує його. Стрептоцид – сульфаніламідний препарат короткої дії, чинить бактеріостатичну дію на стрептококи, менінгококи, пневмококи, гонококи, протей та інші мікроорганізми.

Фармакокінетика. При застосуванні стрептоциду у вигляді мазі препарат практично не всмоктується.

Показання для застосування. Місцеве лікування виразок на шкірі, опіків, інфікованих тріщин шкіри, ран, застосовують при піодермії.

Спосіб застосування та дози. Стрептоцид, мазь призначають зовнішньо, наносячи тонким шаром на уражену поверхню відкритим способом або під марлеву пов'язку. Зазвичай перев'язку роблять через 1-2 дні. Кількість аплікацій на добу, тривалість застосування коригують залежно від характеру захворювання та досягнутого терапевтичного ефекту. Дітям до 6 років призначають з обережністю.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Гіперчутливість до сульфаніламідів та інших компонентів препарату.

Передозування. При передозуванні можуть посилюватися побічні дії препарату. Терапія симптоматична.

Особливості застосування. Перед нанесенням мазі уражену поверхню необхідно промити 3 % розчином перекису водню, оскільки в присутності некротичних тканин, гною та білка антимікробна активність препарату знижується. Передчасне припинення лікування препаратом може призвести до розвитку стійких до сульфаніламідів штамів мікроорганізмів.

Вагітні та жінки у період лактації застосовують препарат з обережністю і лише тоді, коли користь від застосування препарату буде переважати можливий ризик розвитку негативного впливу на плід (дитину).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Новокаїн, який має залишок параамінобензойної кислоти, знижує ефективність Стрептоциду, якщо препарати були застосовані відразу один за одним або одночасно.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С. *Зберігати в недоступному для дітей місці!*

Термін придатності – 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення вказаного терміну придатності.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 г у банках скляних, по 25 г у тубах.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, м. Лубни, Полтавська обл., вул. Петровського, 16.