

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОМКАМФОРА-ЛХ
(BROMCAMPHOR-LH)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або білого з сіруватим відтінком кольору, з запахом камфори. На поверхні допускається наявність мармуровості;

склад: 1 таблетка містить бромкамфори 0,25 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, магнію стеарат, стеаринова кислота, натрію кроскармелоза, полівінілпіролідон низькомолекулярний медичний.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Снотворні та седативні препарати. Броміди.

Код АТС N05C M11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Седативний засіб. Як й інші броміди має здатність концентрувати та підсилювати процеси гальмування в корі головного мозку, особливо при підвищеній збудженості центральної нервової системи. Полегшує настання природного сну. Нормалізує серцеву діяльність.

Фармакокінетика. Легко всмоктується слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту і розподіляється по організму, накопичуючись в основному в позаклітинній рідині. Накопичення бромиду в організмі залежить від балансу хлоридів: при дефіциті солей хлору броміди накопичуються у великих кількостях, частково замінюючи хлориди; надлишкове надходження хлоридів перешкоджає накопиченню бромідів. Виводяться броміди повільно нирками. Виділення з організму може тривати до 2 місяців, при порушенні функції нирок виведення сповільнюється.

Показання для застосування. Підвищена нервова збудженість, неврастенія, істерія, безсоння, астенічний синдром, хорея, кардіоневроз, початкова стадія гіпертонічної хвороби.

Спосіб застосування та дози. Призначають внутрішньо після їжі: дорослим – по 1-2 таблетки 2-3 рази на день, дітям віком 7 - 10 років – по 1 таблетці (0,25 г) 2 рази на день, дітям віком 10 - 14 років – по 1 таблетці (0,25 г) 2-3 рази на день. Максимальна добова доза: для дорослих – 1,5 г; для дітей віком 7-10 років – 0,5 г; для дітей віком 10-14 років – 0,75 г. Курс лікування – 10-15 днів.

Побічна дія. Заторможеність, сонливість, диспептичні явища, алергічні реакції.

Протипоказання. Гіперчутливість до камфори або бромідів, печінкова і/або ниркова недостатність, вагітність, дитячий вік (до 7 років), годування груддю.

Передозування. *Симптоми:* при прийомі великих доз можливий розвиток явищ «бромізму»: дратівливість, атаксія, ослаблення пам'яті, дизартрія, тахікардія, розширення зіниці, кон'юнктивіт, риніт, обкладений язик. *Лікування:* відміна препарату та призначення 10-20 г/добу натрію хлористого з великою кількістю води (3-5 л/добу).

Особливості застосування. При тривалому застосуванні можливий розвиток толерантності. При прийомі препарату на фоні дієти з обмеженням споживання з їжею повареної солі (до 5-10 г солі) можливе посилення седативного ефекту. З обережністю слід застосовувати особам, діяльність яких пов'язана з керуванням транспортними засобами або виконанням роботи, що потребує підвищеної уваги, через можливу сонливість і зниження концентрації уваги.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Потенціювання ефекту спостерігається при одночасному прийомі з препаратами, що пригнічують центральну нервову систему.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від +15 С до +25 С.

Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. По 10 таблеток у контурних чарункових упаковках, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці картонній.

Виробник. ЗАТ «Лекхім-Харків».

Адреса: Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36.