

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РЕВАЙТЛ ЧАСНИКОВІ ПЕРЛИНИ
(REVITAL GARLIC PEARLS)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозорі, еліптичні, м'які желатинові капсули (перлини), які містять блідо-жовту олієподібну рідину із запахом часнику;

склад: 1 капсула містить олію часниковою 0,625 г;

допоміжні речовини: олія арахісова, желатин, гліцерин, розчин сорбітолу (70%), метилгідроксibenзоат, пропілгідроксibenзоат.

Форма випуску. Капсули желатинові.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що знижують рівень холестерину та тригліцеридів у сироватці крові. Код АТС С10А Х10.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Активність часнику визначається вмістом рослинного антибіотика аліцину, алііну, глікозиду глікоміналу (має бактерицидну дію), есенційних ефірних олій, фітостеринів, алілдисульфідів, ненасичених альдегідів, піровиноградної кислоти, інсуліну, аміаку, кальцію, міді, германію, заліза, магнію, фосфору, селену, сірки, калію, цинку, йоду, вітамінів А, В, В₂, С, D. Аліцин – активний компонент часникової олії, підвищує вміст альфа-ліпопротеїнів і знижує рівень бета-ліпопротеїнів, тим самим зменшуючи ризик відкладення жирових речовин типу холестерину на стінках кровоносних судин. Він також сприяє зниженню концентрації холестерину в крові. Часникова олія також не лише запобігає утворенню небезпечних кров'яних тромбів, але й посилює природні відновлюючі процеси в організмі, які сприяють поліпшенню реологічних властивостей крові і підтримують нормальний неперервний кровотік. Чинить імуностимулюючу дію. Є природним протимікробним, противірусним засобом, спричиняє відхаркувальний, потогінний та діуретичний ефекти. Має жовчогінну дію. Виявляє глистогінну активність, особливо проти круглих гельмінтів.

Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату не досліджувалась.

Показання для застосування. Як допоміжний до дієти засіб для регуляції жирового обміну (особливо при підвищеному рівні холестерину). Гіперліпідемія (у складі комбінованої терапії), профілактика атеросклерозу.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям старше 12 років призначають по 1 - 2 капсули 2 рази на день після їди. Відсутнього терапевтичного ефекту можна досягти лише після 2 - 3 тижнів безперервного приймання препарату. Термін лікування залежить від тяжкості та перебігу захворювання.

Побічна дія. В окремих випадках може спостерігатися печія, метеоризм. У поодиноких випадках при використанні терапевтичних доз препаратів часнику спостерігалися головний біль, запаморочення, міалгія, відчуття втоми, абдомінальний дискомфорт, діарея. При вживанні препаратів часнику може спостерігатися подовження кровотечі. В окремих випадках гіперчутливості до часнику може спостерігатися бронхоспазм та сльозотеча.

Протипоказання. Підвищена чутливість до часнику. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Гострий гепатит. Гострий панкреатит. Ранній післяопераційний період. Тяжкі захворювання нирок. Вагітність. Діти до 12 років.

Передозування. Можливі диспептичні розлади, алергічні реакції, що потребують відміни препарату і проведення симптоматичної терапії.

Особливості застосування. Великі дози препарату можуть спричинити подовження кровотечі, тому слід припинити приймання препарату у високих дозах за 2 тижні до запланованого хірургічного втручання. Часник може погіршити органолептичні властивості грудного молока, тому приймання препаратів часнику під час лактації слід обмежити. Безпека застосування препарату у дітей до 12 років не встановлена, тому його застосування у цієї групи пацієнтів можливо лише в тих випадках, коли очікуваний терапевтичний ефект перевищує потенційний ризик.

Вплив на здатність керування транспортними та іншими складними механізмами.

Препарат не має впливу на здатність керування транспортними та складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Одночасне застосування препаратів часнику з антикоагулянтами (варфарин), антиагрегантами (ацетилсаліцилова кислота, дипіридамола) та нестероїдними протизапальними засобами може сприяти підвищенню ризику кровотечі через потенціювання дії щодо зниження агрегації тромбоцитів. Препарати часнику мало впливають на метаболізм препаратів системою цитохрому С₄₅₀.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, сухому місці при температурі не вище 25°C. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 капсул у флаконі із скла; флакон у картонній коробці.

Виробник. Компанія "Ранбаксі Лабораторіс Лімітед".

Адреса. 205/206, Raheja Centre, Nariman Point, Mumbai 400021 India.