

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СИНТОМЦІН
(SYNTHOMYCIN)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: chloramphenicol; Д-(-) трео-1-пара-нітрофеніл-2-дихлорацетиламіно-пропандіол-1,3;

основні фізико-хімічні властивості: лінімент білого або білого зі злегка жовтуватим відтінком кольору, зі слабким специфічним запахом;

склад: 10 г лініменту містять синтоміцину 0,5 мг;

допоміжні речовини: олія рицинова, емульгатор №1, кислота сорбінова (кислота 2,4-гексадієнова), натрій карбоксиметилцелюлоза очищена, вода очищена.

Форма випуску. Лінімент.

Фармакотерапевтична група. Антибіотик для місцевого застосування. Код АТС D06A X02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат активний відносно штамів бактерій, стійких до пеніциліну, стрептоміцину, сульфаніламідів; грамположитивних (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) та грамнегативних коків (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitides*), багатьох бактерій (*Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*, *Proteus stuartii*, ієрсинії), рикетсій, спірохет, збудників трахоми, пситакозу, пахового лімфогранулематозу та інших, володіє протимікробною та антибактеріальною (бактеріостатичною) дією. Механізм дії пов'язаний з порушенням синтезу білків мікроорганізмів. Стійкість мікроорганізмів до хлорамфеніколу розвивається відносно повільно.

Фармакокінетика. Невивчена.

Показання для застосування. Місцеве лікування гнійно-запальних уражень шкіри (карбункули, фурункули), гнійних ран, трофічних виразок, що довго не загоюються, опіків II - III ступеня, тріщин сосків у породіль.

Спосіб застосування та дози. Препаратом просочують марлеві тампони або наносять тонким шаром безпосередньо на уражену ділянку. Зверху накладають звичайну пов'язку, можна з пергаментним або компресним папером. Перев'язки проводять залежно від показань через 1 - 3 дні, іноді через 4 - 5 днів. При тріщинах сосків у породіль після кожного годування соски обмивають 0,25% розчином нашатирного спирту, потім на тріщину накладають стерильну салфетку, вкриту шаром лініменту. При цьому швидко знімаються різкі больові відчуття і через 2-5 днів після початку лікування тріщини загоюються.

Під час лікування тріщин сосків у породіль не потрібно припиняти годування груддю новонароджених. Застосування лініменту запобігає розвитку маститів.

Побічна дія. Можлива місцева подразнювальна дія. В окремих випадках можливі алергічні реакції.

Противоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, псоріаз, екзема, грибкові захворювання шкіри. Не призначають дітям у перші 4 тижні життя.

Передозування. При передозуванні можуть підсилюватися побічні дії препарату. Терапія – симптоматична.

Особливості застосування. Не можна допускати безконтрольного застосування препарату у педіатричній практиці.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Одночасне застосування препарату з еритроміцином, олеандоміцином, нистатином та леворином – підвищує антибактеріальну активність лініменту, а з солями бензилпеніциліну – знижує. Препарат несумісний з цитостатиками, сульфаніламидами, дифенілом, барбітуратами, похідними піразолону та алкоголем.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі від 8 С до 15 С; не допускається заморожування. *Зберігати в недоступному для дітей місці!* Після розкриття туби препарат зберігати протягом курсу лікування. Не застосовувати препарат після закінчення вказаного терміну придатності. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 25 г в туби алюмінієві.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, м. Лубни, Полтавська обл., вул. Петровського, 16.