

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЦИНКУНДАН®
(ZINCUNDANUM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь бежевого кольору, з відтінком від сіруватого до рожево-сіруватого кольору;

склад: 1 г мазі містить кислоти ундециленової 100 мг, цинку ундециленату 100 мг, кислоти саліцилової аніліду - 100мг;

допоміжні речовини: етилцелозольв, емульгатор №1, метилцелюлоза водорозчинна, вода очищена.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування.

Код АТС D01A E04.

Фармакологічні властивості. Протигрибковий засіб. Виявляє активність відносно дерматофітів: *Epidemophyton*, *Trichophyton*, *Micoglossum spp.* Справляє фунгістатичну дію. При сполученні з цинковою сіллю (цинку ундециленат) активність ундециленової кислоти зростає.

Показання для застосування. Грибкові захворювання шкіри: дріжджові мікози; дерматомікози, такі як епідермофітія, трихофітія.

Спосіб застосування та дози. Місцево. Препарат втирають в уражені ділянки шкіри 2 рази на добу (вранці і ввечері). Тривалість лікування залежить від характеру, перебігу хвороби і від результатів мікроскопічних досліджень до зникнення патогенних грибів. Переважно курс лікування триває 15 - 20 днів або більше, залежно від ефективності.

Побічна дія. Можливі місцеві алергічні реакції (набряк, свербіж).

Протипоказання. Алергічна реакція на компоненти мазі; вагітність, лактація.

Передозування. Інформація відсутня.

Особливості застосування. Після закінчення курсу лікування рекомендовано проводити профілактичне застосування препарату 1 - 2 рази на тиждень. Під час лікування маззю і після його закінчення рекомендується припудрювати уражені місця порошком "Дустундан", до складу якого входять основні складові частини мазі Цинкундан і тальк.

Досвіду застосування мазі для лікування дітей немає.

Уникати потрапляння мазі в очі. Якщо таке трапилося, слід ретельно промити очі водою.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Мазь можна застосовувати з іншими протигрибковими засобами.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі 8 - 15°C. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 15 г у банці або в тубі, вкладеній в пачку.

Виробник. АТ "Галичфарм".

Адреса. Україна, 79024, М.Львів, вул. Опришківська, 6/8.