

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛІДОЛ-ЛУБНИФАРМ
(VALIDOL-LUBNYPHARM)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, характерного запаху ментолу і холодячого смаку. На поверхні таблетки допускається сіре вкраплення;

склад: 1 таблетка містить розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової 0,06 г (60 мг);

допоміжні речовини: цукор, кальцію стеарат.

Форма випуску. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Різні комбіновані кардіологічні препарати. Код АТС С01ЕХ.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Виявляє помірну рефлекторну, судинорозширювальну (коронаророзширювальну) та седативну дію внаслідок подразнення чутливих нервових рецепторів слизової оболонки ротової порожнини. Виявляє помірну седативну дію.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Функціональні кардіалгії, напади стенокардії ангіоневротичного характеру, а також легкі, нетривалі напади стенокардії при ішемічній хворобі серця, неврози, нудоти невротичного характеру.

Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям віком від 12 років Валідол-Лубнифарм призначають сублінгвально по 1 - 2 таблетки під язик до повного розсмоктування 2 рази на день. Добова доза, зазвичай, становить 2 - 4 таблетки по 0,06 г. При необхідності добова доза може бути збільшена.

Побічна дія. У поодиноких випадках при застосуванні Валідолу-Лубнифарм можуть спостерігатися нудота, сльозотеча, запаморочення.

Протипоказання. Виражена гіпотонія, підвищена чутливість до компонентів препарату, діти до 12 років.

Передозування. При передозуванні можуть підсилюватися побічні дії препарату. Терапія – симптоматична.

Особливості застосування. Таблетку покласти під язик і тримати її до повного розсмоктування. Безпечність та ефективність застосування препарату для лікування у дітей віком до 12 років не встановлені. За необхідності призначення Валідолу-Лубнифарм дитині потрібна попередня консультація лікаря-педіатра.

Невідомо, чи потрапляє розчин ментолу в кислоті ізовалеріановій в грудне молоко, тому від прийому Валідолу-Лубнифарм жінкам, які годують груддю, слід утримуватись.

При недостатньо вираженому антиангіональному ефекті або коли у деяких хворих у найближчі 5 хв після застосування препарату ефект не спостерігається, слід обов'язково переходити на антиангіональну терапію нітратами.

Враховуючи можливі побічні ефекти препарату, застосовувати його водіям автотранспортних засобів та операторам потенційно небезпечних механізмів під час роботи не рекомендується.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат нейтралізує побічну дію нітратів (головний біль тощо) завдяки вазодилатційному ефекту.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від вологи та світла місці при температурі від 8 С до 15 С. Термін придатності – 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Таблетки по 0,06 г № 6 у контурних чарункових упаковках.

Виробник. ВАТ "Лубнифарм".

Адреса. Україна, 37500, м. Лубни, Полтавська обл., вул. Петровського, 16.