

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАНЕФРОН®Н (CANEPHRON® N)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора або злегка мутна рідина жовто-коричневого кольору; смак - трохи гіркуватий, запах - ароматний (подібний до пахоців кореня любистку);

склад: 100 г крапель містить 29 г водно-спиртового екстракту, виготовленого на 59 % етиловому спирті з лікарських рослин :

трави золототисячника (Herba Centaurii)	0,6 г
кореня любистка (Radix Levistici)	0,6 г
листя розмарина (Folia Rosmarini)	0,6 г

вміст етанолу: 19 об.%;

допоміжні речовини: вода очищена.

Форма випуску. Краплі для перорального застосування.

Фармакологічна група. Засоби, що застосовуються в урології. АТС G04B X50.

Фармакологічні властивості. Рослинні компоненти, що входять до складу препарату, виявляють комплексну активність, що проявляється у протизапальній дії та усуненні спазму сечовивідних шляхів, сечогінному, вазодилатційному та антибактеріальному ефектах. Під впливом препарату посилюється виділення солей сечової кислоти і змінюється кислотність сечі, що попереджує утворення та ріст конкрементів у сечовивідних шляхах і протидіє росту бактерій.

Внаслідок дії розмаринової кислоти пригнічується вивільнення медіаторів запалення, що зумовлює стійкий протизапальний ефект. Усі рослинні компоненти, що входять до складу Канефрону® Н, містять речовини (фенолкарбонові кислоти, ефірні олії та ін.), що зумовлюють широкую антимікробну дію препарату. Дія препарату на каналцеву і клубочкову систему нирок призводить до зниження виділення білка при протеїнурії.

Показання для застосування. Основна (базисна) терапія, а також як компонент комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит).

Хронічні неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит).

Профілактика утворення сечових камінців, у тому числі й після їх видалення.

Спосіб застосування та дози. Препарат приймають у такому дозовому режимі:

- дорослі – по 50 крапель 3 рази на день;
- діти до 1 року – по 10 крапель 3 рази на день;
- діти віком 1-5 років – по 15 крапель 3 рази на день;
- діти з 6 років – по 25 крапель 3 рази на день.

Після ослаблення гостроти захворювання прийом препарату слід продовжувати протягом 4-6 тижнів. Краплі приймають, як правило, в нерозведеному вигляді. Дітям краплі треба додавати у сік або чай. Перед вживанням збовтувати.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції на складові компоненти препарату.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Можливі та доцільні комбінації Канефрону® Н з антибіотиками.

Негативні ефекти внаслідок взаємодії препарату з іншими медикаментами невідомі.

Передозування. Випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.

Особливості застосування. Під час зберігання можливе незначне помутніння або випадання осаду: це не впливає на дію препарату. При дотриманні рекомендацій щодо застосування і після консультації з лікарем препарат можна приймати під час вагітності та при годуванні груддю.

При застосуванні крапель Канефрон Н необхідно споживати достатню кількість рідини.

Препарат в рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортом і працювати з механізмами.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці! Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Термін придатності. 3 роки. Відкритий флакон можна використовувати протягом 6 місяців.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 100 мл у флаконі в картонній коробці.

Виробник. Біонорика АГ.

Адреса. Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина.