

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЦИПРОФЛОКСАЦИН
(CIPROFLOXACINUM)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: ciprofloxacin; 1-циклопропіл-6-фтор-1,4-дигідро-4-оксо-(1-піперазиніл)-3-хінолінкарбонова кислота;

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина з зеленувато-жовтуватим відтінком;

склад: 1 мл містить ципрофлоксацину гідрохлориду в перерахунку на ципрофлоксацин –

3 мг;

допоміжні речовини: динатрію едетат, натрію хлорид, бензалконію хлорид, вода очищена.

Форма випуску. Краплі очні/вушні.

Фармакотерапевтична група. Препарати, які застосовують в офтальмології та отології. Протимікробні засоби. Код АТС S03A A07.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика. Протимікробний препарат широкого спектра дії з групи фторхінолонів. Діє бактерицидно. Препарат інгібує ДНК-гіразу бактерій, що призводить до загибелі мікробів. Ципрофлоксацин діє як на бактерії, що розмножуються, так і на ті, що знаходяться у фазі спокою. Чутливі до ципрофлоксацину наступні грамнегативні мікроорганізми: *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus spp.* (індолпозитивний і індолнегативний), *Morganella morganii*, *Citrobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Yersinia spp.*, *Virbio spp.*, *Hafnia spp.*, *Providencia stuartii*, *Haemophilus influenzae*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas spp.*, *Gardnella spp.*, *Legionella pneumophila*, *Neisseria spp.*, *Moraxella catarrhalis*, *Acinetobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Chlamidia spp.*, а також грампозитивні мікроорганізми: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pyogenes*, *St. agalactiae*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Listeria monocytogenes*.

Фармакокінетика. Біодоступність препарату 70 - 80%.

Показання для застосування. Інфекційні захворювання очей (блефарити, кон'юнктивіти, іридоцикліти) та середнього вуха, гнійна ранова інфекція очей та вух.

Спосіб застосування та дози. При захворюваннях очей дорослим в перші 6 - 8 годин призначають по 1 - 2 краплі через кожні 1 - 2 години, потім по 1 - 2 краплі 3 - 4 рази на добу.

При захворюваннях вуха дорослим закапують по 3 - 4 краплі 3 - 4 рази на добу і закладають тампон, змочений препаратом. Тривалість лікування – 3 - 5 днів.

Побічна дія. Диплопія, хроматопсія, шум у вухах. У деяких випадках можливий розвиток алергічних реакцій.

Протипоказання. Вірусні та грибкові захворювання очей та вух. Підвищена чутливість до компонентів препарату або інших хінолінів. Не рекомендується до застосування під час вагітності, у період лактації, дітям у віці до 15 років.

Передозування. При застосуванні розчину Ципрофлоксацину не відзначалося випадків передозування.

Особливості застосування. Краплі повинні бути нагріті до температури тіла. У період лікування препаратом не рекомендується носіння м'яких контактних лінз. При використанні твердих контактних лінз слід зняти їх перед закапуванням і знову одягти через 15 - 20 хв після інстиляції препарату.

Пацієнтам, у яких після аплікації очних крапель Ципрофлоксацину тимчасово втрачається чіткість зору, не рекомендується водити машину або працювати зі складною технікою, станками або будь-яким іншим складним обладнанням, яке потребує чіткості зору відразу після застосування препарату.

Перед закапуванням препарату у вуха необхідно провести аспірацію гною та промивання зовнішнього слухового проходу антисептичним розчином.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія розчину Ципрофлоксацину з іншими препаратами не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від 8 С до 15 С. Термін придатності – 2 роки. Термін зберігання розчину після розкриття флакону – 28 днів.

Умови відпуску. За рецептом.

Упаковка. Флакони по 5 мл з кришкою-крапельницею.

Виробник. Філія ТОВ "Дослідний завод „ГНЦЛС”.

Адреса. Україна, м. Харків, вул. Воробйова, 8.