

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАНГОГЕРПІН
(MANGOHERIN)

Загальна характеристика:

хімічна назва: 2-С-бета-D-глюкопіранозидо-1, 3, 6, 7-тетраоксиксантон;

основні фізико-хімічні властивості: від жовтуватого до зеленкувато-жовтого кольору гомогенний крем без запаху;

склад: 1 г крему містить мангіферину 0,02 г;

допоміжні речовини: цетостеарилу сульфат (Ланнет Е), метилгідроксibenзоат, пропілгідроксibenзоат, Цетіол ОС, Емульгад СМ, Космедіа SPL, етанол 96%, вода очищена.

Форма випуску. Крем для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Протівірусні засоби. Код АТС D06B B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Протівірусний засіб, який отримують із трави копіїчника альпійського (*Hedysarum alpinum L.*), копіїчника жовтіючого (*Hedysarum flavescens Rgl. et Schmalh.*) родини метеликових або технічного мангіферину, який отримують з листя манго (*Mangifera indica L.*) родини сумахових. Препарат має протівірусну активність щодо ДНК-вміщуючих вірусів (*Herpes simplex I* і *II* типу, *Varicella zoster*, меншою мірою – цитомегаловірусу і вірусу імунодефіциту людини). Інгібує репродукцію вірусу простого герпесу на ранніх стадіях його розвитку.

Фармакокінетика. Препарат при зовнішньому застосуванні не всмоктується.

Показання для застосування. Лікування первинних і рецидивуючих уражень шкіри і слизових оболонок, які сричинені вірусами *Herpes simplex I* і *II* типу, лікування вітряної віспи, оперізувального лишая, герпетиформної екзема Капоші, дерматозів вірусного генезу (червоного плескатоого лишая).

Спосіб застосування та дози. Мангогерпін крем 2% призначають дітям старше 1 року. Терапевтичний ефект препарату найбільше виражений при призначенні на початку захворювання або рецидиву. Перед нанесенням крему уражену ділянку ретельно промити водою і висушують.

Крем застосовують місцево 4 - 6 разів на добу.

Тривалість курсу залежить від форми та тяжкості перебігу захворювання.

При гострих і рецидивуючих формах простого герпесу екстрагенітальної локалізації при поодиноких висипаннях крем тонким шаром наносять на вогнище ураження протягом 3 - 5 діб. У випадку поширених висипань, а також за наявності пропасниці, лімфоаденопатії Мангогерпін крем застосовують протягом 5 - 14 діб. Одночасно дітям старше 6 років призначають Мангогерпін у капсулах, у відповідних вікових дозах.

Для лікування герпетиформної екзема Капоші Мангогерпін крем застосовують протягом 7 - 21 доби. При генітальному герпесі крем наносять на уражені ділянки 4 - 6 разів на добу протягом 7 - 10 діб. У випадку рецидивуючого перебігу генітального герпесу призначають дітям старше 6 років додатково Мангогерпін у капсулах внутрішньо протягом 5 - 14 діб.

При вірусних ураженнях слизової оболонки ротової порожнини крем наносять на уражені ділянки протягом 5 - 15 діб, при ерозивно-виразковій формі червоного плескатоого лишая слизової оболонки ротової порожнини – протягом 2 - 4 тижнів. При захворюваннях, спричинених *Varicella zoster* (оперізувальний лишай, вітряна віспа), проводять комбіновану терапію: внутрішньо дітям старше 6 років призначають Мангогерпін у капсулах (у відповідних вікових дозах) і місцево – крем на уражену ділянку протягом 5 - 21 доби.

При рецидивах проводять повторні курси лікування. Для профілактики рецидивів Мангогерпін призначають внутрішньо у капсулах через місяць після закінчення лікування і потім у міжрецидивні періоди курсами по 10 - 14 діб.

Застосування Мангогерпіну в капсулах при проведенні комбінованої терапії дозволено лише дітям старше 6 років.

Побічна дія. Алергічні реакції.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату; діти до 1 року.

Передозування. Випадків передозування не спостерігалось.

Особливості застосування. Для ефективності лікування препарат рекомендується застосовувати при виникненні перших симптомів герпесу. Крем не можна застосовувати в офтальмологічній практиці.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Взаємодія не описана.

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла і вологі місці при температурі нижче 30 С. Термін приданості – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 10 г крему в тубі, у картонній паці.

Виробник.

БВ ФАРМА ДЖОІНТ ВЕНТУРІ КОМПАНІ (БВ ФАРМА), В'єтнам.

BV PHARMA JOINT VENTURE COMPANY (BV PHARMA), Vietnam.

Адреса. Тан Тхань Тай Вард, Ку Чьї Провінсе, м. Хошімін, В'єтнам.

Tan Thanh Tay Ward, Cu Chi Province, Ho Chi Minh City, Vietnam.