

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФОКОРТ®-ДАРНИЦЯ
(FOCORT-DARNITSA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: triamcinolone, 1 г крему містить триамцинолону ацетоніду в перерахуванні на 100 % безводну речовину – 1 мг;

допоміжні речовини: цетилпіридинію хлорид, пропіленгліколь, спирти синтетичні жирні первинних фракцій C₁₆-C₂₀ або цетостеариловий спирт, парафін білий м'який (вазелін), парафін рідкий (вазелінове масло), парафін твердий, вода очищена.

Лікарська форма.

Крем для зовнішнього застосування.

Крем білого кольору однорідної консистенції.

Назва і місцезнаходження виробника. ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

Фармакотерапевтична група. Кортикостероїди для застосування в дерматології. Триамцинолон.

Код АТС D07A B09.

Фармакологічні властивості. Триамцинолону ацетонід, діюча речовина препарату Фокорт®-Дарниця, – фторований глюкокортикостероїд. Чинить виражену протизапальну, протиалергічну й антиексудативну дію. Взаємодіючи зі специфічним білковим рецептором у тканинах-мішенях, регулює експресію кортикоїдзалежних генів і впливає на синтез білка. Зменшує утворення, вивільнення й активність медіаторів запалення (гістаміну, кініну, простагландинів, лізосомальних ферментів). Пригнічує міграцію клітин до місця запалення; зменшує вазодилатацію і підвищену проникність судин у осередку запалення. Стабілізує лізосомальні ферменти мембран лейкоцитів. Пригнічує синтез антитіл і порушує розпізнавання антигену. Гальмує вивільнення інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-2, гама-інтерферону з лімфоцитів і макрофагів. Індукує утворення ліпокортину, пригнічує вивільнення еозинофілами медіаторів запалення і стабілізує мембрани тучних клітин. Усі ці ефекти беруть участь у пригніченні запальної реакції в тканинах у відповідь на механічне, хімічне чи імунне ушкодження.

Показання для застосування. Прості й алергічні дерматити. Екзема. Атопічний дерматит. Дифузійний нейродерміт. Псоріаз. Гранульома кільцеподібна. Червоний плесканий лишай. Простий хронічний лишай (обмежений нейродерміт). Токсидермія. Келоїдні рубці. Гніздова алопеція, повна алопеція. Укуси комах.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату. Бактеріальні, вірусні і грибові захворювання шкіри. Рак шкіри. Вагітність. Годування груддю.

Особливі застереження.

Не рекомендується наносити на великі поверхні.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Не застосовують у період вагітності або годування груддю.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції, його можна в рекомендованих дозах приймати особам, що керують транспортними засобами і працюють зі складними механізмами.

Діти. Застосування Фокорт®-Дарниця у дітей можливо, коли очікувана користь перевищує ризик появи побічних ефектів. Необхідно уникати тривалого застосування у дітей незалежно від віку. При тривалому застосуванні для профілактики місцевих інфекційних ускладнень можливе застосування в сполученні з протимікробними лікарськими засобами.

Не рекомендується наносити на великі поверхні. Слід пам'ятати, що чим більша площа нанесення препарату, тим вища ймовірність прояву побічної дії.

Спосіб застосування та дози. Препарат наносять 1–2 рази на добу тонким шаром на уражену ділянку, злегка втираючи в шкіру. Допускається застосування оклюзійної пов'язки – 10 г. Максимальна тривалість лікування – до 14 днів.

Вища добова доза для дорослих – 45 г крему.

Передозування. Про випадки передозування, що супроводжувалися б клінічними симптомами, не повідомлялося.

Допускається, що застосування протягом тривалого часу у високих дозах на великих ділянках шкіри збільшує ризик розвитку системних глюкокортикоїдних ефектів, пригнічення гормонсинтезуючої функції кори надниркових залоз.

Лікування. Відмінити застосування препарату. Залишки препарату на шкірі змити теплою водою з милом.

Побічні ефекти. При застосуванні препарату іноді можуть виникати свербіж, подразнення шкіри, контактна екзема, стероїдні вугри, пурпура. При тривалому застосуванні можливий розвиток вторинних інфекційних уражень і атрофічних змін шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій. Глюкокортикостероїдні препарати системної дії підсилюють ефекти Фокорт®-Дарниця. Спільне застосування з антимікробними препаратами місцевого застосування сприяє профілактиці вторинної інфекції при тривалому використанні препарату.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Препарат необхідно зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі від 15 °С до 25 °С.

Упаковка. По 15 г, 30 у тубі, по 1 тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.