

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЕСПОЛ
(ESPOL)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: мазь від світло-бурого до червонувато-бурого кольору зі слабким специфічним запахом;

склад: 1 г мазі містить екстракту перцю стручкового 0,1 г, димексиду (диметилсульфоксиду) 0,03 г;

допоміжні речовини: олія коріандру ефірна, олія лавандова ефірна, хлороформ, ланолін безводний, вазелін.

Форма випуску. Мазь для зовнішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при м'язовому та суглобовому болю. Код АТС M02AB.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат має місцево подразнювальну, відволікаючу та анагезуючу дію. Викликає розширення поверхневих судин, гіперемію, відчуття теплоти та покращання кровообігу в шкірі та підшкірній клітковині. Дія мазі починається за 10 – 15 хвилин після її втирання в шкіру.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. М'язовий та суглобовий біль (невралгії, радикуліт, деформуючий артроз, люмбаго, попереково-крижовий радикуліт), забиття, розтягнення та розрив м'язів без порушення цілісності шкірних покривів, лікування наслідків вивихів та переломів.

Спосіб застосування та дози. Злегка втирають в шкіру 2-3 г мазі 2-3 рази на день. Для підсилення ефекту можна накласти суху зігріваючу пов'язку. Тривалість лікування 1 – 10 днів.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції (свербіж, лущення шкіри, відчуття печіння у місці нанесення мазі). Ці явища швидко минають після відміни препарату.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, порушення цілісності шкірних покривів, вагітність, лактація.

Передозування. Випадки передозування не описані. При правильному застосуванні препарату передозування неможливе.

Особливості застосування. Застосування у дітей – з обережністю, не застосовувати зігріваючі пов'язки. Не допускати попадання мазі в очі та на слизові оболонки. Після застосування мазі слід вимити руки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. На даний час не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі 12 - 15 °С. Термін придатності - 2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Алюмінієві туби по 30 г.

Виробник. ВАТ "НИЖФАРМ".

Адреса. Російська Федерація, 603950, Нижній Новгород, ГСП-459, вул. Салганська, 7.