

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СУЛЬФАЦИЛ НАТРІЮ
(SULFACYL SODIUM)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назва: сульфацетамід; пара-амінобензол-сульфацетамід-натрій.

основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовтуватого кольору рідина, рН від 7,5 до 8,5;

склад: 1 мл розчину містить 0,2 г сульфацилу натрію;

допоміжні речовини - натрію тіосульфат, 1 М кислота хлористоводнева до рН 8,0, вода для ін'єкцій.

Форма випуску. Краплі очні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в офтальмології. Сульфаніламідни. Код АТС S01A B04.

Фармакологічні властивості. Сульфаніламідний препарат. Має протимікробну та бактеріостатичну дію у відношенні стрептококів, гонококів, пневмококів, колі-бацил. За рахунок подібності за хімічною структурою с пара-амінобензойною кислотою, порушує утворення мікроорганізмами необхідних для їх розвитку факторів росту – фолієвої та дигідрофолієвої кислот.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні проникає у тканини та рідини ока. Всмоктується в системний кровотік через запалену кон'юнктиву.

Показання для застосування. Блефарити, кон'юнктивіти, кератити, гнійні виразки рогівки та інші інфекційні захворювання очей. Профілактика бленореї у новонароджених.

Спосіб застосування та дози. Для відкриття тюбика-крапельниці повернути кришку до її повного відокремлення від корпусу. Закапувати по 2-3 краплі 5-6 разів на день в кон'юнктивальний мішок ураженого ока шляхом легкого натискання на стінки тюбик-крапельниці. Для профілактики бленореї у новонароджених закапувати по 2 краплі в обидва ока безпосередньо після народження і по 2 краплі через 2 години.

Побічна дія. Інколи може спостерігатися подразнення тканин ока у вигляді печії або почервоніння.

Противпоказання. Наявність в анамнезі токсико-алергічних реакцій на сульфаніламідни.

Передозування. Не описано.

Особливості застосування. Не описані.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Сульфацетамід при місцевому застосуванні не сумісний з солями срібла.

Умови та термін зберігання. У прохолодному, захищеному від світла місці. Тривалість зберігання - 2 роки. Термін придатності після відкриття тюбик-крапельниці - 28 діб. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 1 мл у поліетиленових тюбик-крапельницях № 5, 10.

Виробник. ТОВ "Стиролбіофарм"

Адреса. 84610, Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 97